De kieviten werden verrast met een laagje sneeuw op de weilanden en akkers. Foto: Johan Drop.

DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING

Afdeling: Fleringen

Vergelijking resultaten 2022 en 2021

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kievit	37	39	44	40	26	29	16	7	18	29
Grutto	1	-	1	-	0	-	1	-	0	-
Scholekster	4	3	4	3	3	2	1	1	4	Onb.
Wulp	4	4	2	5	1	3	1	2	3	5
Tureluur	3	2	1	0	1	2	Onb.	0	2	-

De kievit

Het aantal broedparen was na een kleine opleving helaas weer iets minder dan in 2021. Door het zachte winterweer in januari en februari lieten de kieviten zich alweer vroeg zien in onze omgeving. De eerste kieviten werden gemeld door B. Kemerink op 11 februari. Aangemoedigd door de weersomstandigheden liet het eerste legsel niet lang op zich wachten.

Nadat landelijk op 9 maart het eerste kievitsei werd gevonden in Hengevelde was het Gerard Hofhuis die vier dagen later op 13 maart het eerste kievitsei in ons verenigingsgebied wist te vinden. Hiermee vond de aftrap plaats van het weidevogelseizoen 2022. Na het zachte winterweer met vooral in februari heel veel neerslag (147mm in onze omgeving) werd het eind maart en de eerste tien dagen van april gevoelig kouder. Begin april werden de kieviten verrast met zelfs een laagje sneeuw op de weilanden en akkers. Hierna volgde een lange vrij droge periode die zijn weerslag had op de jonge weidevogels met name de jonge kieviten.

Het grootste deel van de 44 gevonden legsels werd opgezocht in tweede helft maart en in de loop van april. Van deze eerste legsels zijn maar weinig jongen groot gekomen. Eind april begin mei werden nog maar weinig alarmerende kieviten met jongen gehoord of gezien. Tevens leken enkele deelgebieden door de aanhoudende droogte al grotendeels door de broedvogels te zijn verlaten.

De vervolglegsels in mei leken succesvoller te zijn verlopen en zijn voor een groot gedeelte ook uitgekomen. Maar door de maisgroei blijft het lastig de uitgekomen jongen goed te volgen. Al met al werden 18 volgroeide kuikens geteld.

Jonge kieviten zijn moeilijk te volgen tussen de maisplanten. Foto: Johan Drop.

Grutto

Na jaren van afwezigheid was er weer een broedpaar grutto's in Fleringen. Het broedpaar was door de late aankomst lange tijd onopgemerkt gebleven. Het legsel werd als bijvangst gevonden toen er in de avonduren met een drone naar reekalveren werd gezocht. Omdat er de volgende dag zou worden gemaaid is hierop het legsel gemarkeerd. Hoewel het legsel nog wel werd ontzien met het grasmaaien, bleek het te zijn verlaten.

Scholekster

Na jaren van tegenslag was er eindelijk weer eens een positief resultaat voor deze zwart wit uitgedorste weidevogel. Totaal vier broedparen streken neer in het Fleringse zoekgebied; één meer als het vorige seizoen. Er waren vier legsels waarvan er drie zijn uitgekomen en in tegenstelling tot voorgaande jaren werden het afgelopen jaar wel vliegvlugge jonge scholeksters gezien. De eerste jongen werden gezien door Bas Busscher die begin juni de jonge scholeksters heeft overgezet met het grasmaaien. In de weken daaropvolgend liepen de beide broedvogels, met in hun kielzog de jongen, achter de loopstal op het erf. Hierbij sloot een van de jongen zichzelf op in een kippenren. Eenmaal weer losgelaten was de aansluiting bij zijn nestgenoot weer snel gevonden en beide jongen werden vliegvlug. Het tweede broedpaar met inmiddels twee bijna vliegvlugge jongen zocht in de droge julimaand zijn heil op het erf van Herman en Elly Booijink. Regenwormen genoeg in het met regelmaat gesproeide gazon.

Jonge scholekster had zich vastgelopen in een ren op het erf. Foto: Bas Busscher.

Wulp

Het aantal broedparen van de wulp bleef gelijk aan het vorige seizoen. Er waren minimaal twee broedsels waarvan er feitelijk een werd gevonden. Het legsel door de boer gevonden bij het afzetten van beweidingslint. De afzetting van het legsel in combinatie met een hoge beweidingsdruk was voor de broedvogel kennelijk een te grote verstoring gezien het legsel helaas werd verlaten. Van twee broedparen bleef het onduidelijk of en in welk perceel de broedplek was. Ook van deze broedparen zijn geen jongen waargenomen zodat hoogstwaarschijnlijk eventuele legsels zijn mislukt. Dat het vierde broedpaar wel succesvol was geweest werd pas duidelijk toen het paar werd gezien met drie al redelijk grote jongen.

Tureluur

Verdeeld over twee deelgebieden werden van de tureluur totaal drie paartje aangetroffen. In het deelgebied met een paar bleef het bij de vaststelling van een aanwezig broedpaar maar van een broedsel of jongen is echter niets vernomen. In het tweede deelgebied was één paar met twee vliegvlug geworden jongen succesvol.

Eén van de twee jonge tureluurs met oplettende ouder. Foto: Johan Drop.

Afdeling Weerselo

Vergelijking resultaten 2022 en 2021

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kievit	27	20	29	20	19	14	10	6	12	17
Grutto	3	3	3	2	0	0	3	2	0	0
Scholekster	3	2	1	1	1	1	0	0	2	2
Wulp	3	4	2	2	1	1	2	1	2	2
Tureluur	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2

Kievit

Het aantal kievitsbroedparen is in 2022 gelukkig niet verder gedaald, maar zelfs met 7 paartjes toegenomen t.o.v. 2021. In 2021 telden we 20 broedparen en in 2022 27 paartjes. Na jaren een dalende trend te hebben meegemaakt, is het nu hopen dat de huidige stand zich zal blijven stabiliseren en misschien zelfs nog verder kan toenemen.

Twee kievit paartjes waren succesvol op het Zoekerveld. Foto: Johan Drop.

De winter van 2022 bracht niet veel winterweer. Door een vaak dominante westelijke stroming was het juist vaak zacht met zelfs op enkele dagen temperaturen rond de 15 graden. In de maanden december en januari viel er relatief weinig neerslag, maar de maanden februari en maart kenden veel regendagen. Begin april viel er nog sneeuw en het was ook opvallend koud in deze maand.

De kievitspaartjes lieten zich alweer vroeg in het seizoen zien in de broedgebieden. Door het zachte weer was de drang om te gaan broeden groot. Opvallend is, ook dit jaar weer, dat de broedparen zich steeds meer gaan clusteren in enkele broedgebieden. In Weerselo kennen we nog slechts 4 deelgebieden waar de kieviten in groepjes broeden. Hier en daar kun je nog wel een enkel broedpaar aantreffen, maar dit heeft vaak weinig kans om succesvol te zijn. Over het algemeen kiest de kievit voor een maisland om er een legsel te produceren.
Toch troffen we in een weiland aan de Legtenbergerstraat 8 legsels van de kievit aan. Helaas is van al deze legsels uiteindelijk geen enkel kuiken vliegvlug geworden. Op andere plekken was, als gevolg van predatie en landbouwwerkzaamheden, het eerste legsel van de kievit ook vaak niet succesvol. Uitzondering hierop waren 2 broedparen in het Zoekerveld, deze paartjes hadden geen last van verstoring en brachten 5 jonge kieviten groot. Ook dit jaar weer bleek dat latere – tweede - legsels, die bijna allemaal op maisland te vinden waren, meer succes hadden. Door de vrijwilligers wordt ingeschat dat van deze legsels 7 jonge kieviten vliegvlug zijn geworden. Al met al komt de teller in 2022 op 12 vliegvlugge jonge kieviten.

Grutto

Het lijkt maar niet te willen lukken met de grutto in Weerselo. Al enkele jaren is deze weidevogel er niet in geslaagd om met succes jongen groot te brengen. Het aantal broedparen van de grutto kwam ook dit jaar weer uit op 3 paartjes. Deze broedparen bevonden zich in de omgeving van de Legtenbergerstraat, alwaar ze een kruidenrijk weiland hadden uitgekozen om te gaan broeden. Van een paartje werd het nest gevonden en gemarkeerd.

Later werden twee andere nesten met behulp van een drone gevonden. De betreffende landbouwer heeft de nesten gespaard door ruim om de nesten heen te maaien. Na het maaien zijn de nesten ingerasterd met stroomdraad. Helaas was, ondanks alle inspanningen, het uiteindelijke resultaat teleurstellend. Na enkele dagen werd het erg stil in het weiland en bleken de oudergrutto's te zijn vertrokken. Bij controle van de nesten bleek dat de eieren nog in het nest lagen, maar koud waren. De juiste toedracht is onduidelijk, maar vreemd genoeg hadden de grutto's het nest verlaten. Hiermee was ook in 2022 de kans op jonge grutto's verkeken.

Scholekster

Wie kan er niet genieten van deze prachtige zwart witte steltloper met zijn lange oranjerode snavel en roze poten, die je vanwege het ultieme te-piet te-piet geluid al van verre kunt horen aankomen. In de herfst en winter kun je ze voornamelijk in het waddengebied aantreffen, maar in het voorjaar trekken veel scholeksters het binnenland in om te gaan broeden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar maisvelden, maar in toenemende mate broeden ze ook op daken van sport- of fabriekshallen.

Van de scholekster werden er 3 broedparen geteld in 2022, dat is een paartje meer t.o.v. 2021. Een paartje bevond zich voortdurend op het industrieterrein De Echelpoel maar hier zijn geen vliegvlugge jongen uit voortgekomen. Een van de andere Weerselose broedparen kende wel een succesvol broedseizoen. Dit paartje had haar nestgelegenheid gevonden op een maisland. Het eerste legsel is misgegaan, maar van het 2e legsel zijn 2 jonge kuikens vliegvlug geworden. De jongen werden samen met de ouders nog lang waargenomen in de omgeving van de broedplek.

Wulp

Nederland is zowel in als buiten het seizoen een belangrijk land voor de wulp. In de winter kun je ze in grote aantallen aantreffen aan de kust, maar in het vroege voorjaar trekken ze het binnenland in. Op het moment dat je de prachtige baltszang met aanzwellende fluittonen en aanhoudende trillers van de wulp weer hoort, krijg je echt het gevoel dat de lente weer in aantocht is. Ook dit jaar weer werden in het vroege voorjaar, zo rond midden februari, de eerste wulpen gehoord en waargenomen. Aanvankelijk hielden ze zich vooral op in de omgeving van het Zoekerveld, maar later trokken ze naar hun broedgebied.

Eén van de twee jonge wulpen in Weerselo. Slechts één paartje bracht twee jongen groot. Foto: Johan Drop.

In tegenstelling tot geluiden dat de stand van de wulp redelijk stabiel blijft, neemt het aantal paartjes in Weerselo af. Lange tijd hadden we 5 of 6 paartjes, maar dit jaar moesten we het doen met 3 paartjes. Slechts één paartje bracht een succesvol broedsel voort. Dit paartje broedde in de omgeving van de Wolfsbergweg. Door goede samenwerking met de betreffende landbouwer werd het nest bij de landbewerkingen gespaard. Uit dit legsel kwamen 2 vliegvlugge jongen voort. De andere 2 paartjes kenden minder succes. De nesten van deze paartjes werden voortijdige gepredeerd.

Scholekster met twee jongen in omgeving van broedplek. Foto: Frans Stopel.

Tureluur

In 2021 konden we nog melding maken van 2 tureluurpaartjes in het Zoekerveld, die 2 vliegvlugge jongen voortbrachten.
Dit voorjaar werden er weer tureluurs waargenomen in het Zoekerveld, maar tot broeden is het niet gekomen. Op een gegeven moment waren de tureluurs vertrokken. Ook aan de Lemselosestraat werd een tijdlang een tureluur waargenomen, maar ook deze is uiteindelijk naar elders vertrokken.

Afdeling Agelo

Vergelijking resultaten 2022 en 2021

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kievit	44	47	44	45	38	38	6	9	21	31
Grutto	2	4	2	2	2	3	0	1	2	3
Scholekster	2	1	2	1	2	1	0	0	2?	2
Wulp	8	8	8	8	4	3	4	5	10	6
Tureluur	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2

Inleiding

Het aantal broedparen weidevogels op de Ageleres en in het Agelerveld was vergeleken met het vorig jaar vrij stabiel.
Het weer was weer de bepalende factor voor de broedresultaten, met name voor de kievit.
Het voorjaar was vrij vroeg, maar toen sloeg de droogte toe die de hele zomer aanhield. Dit was funest voor de kievit kuikens. De wulp met acht broedparen in beide gebieden deed het weer goed. De grutto en de scholekster hadden ieders twee broedsels waarbij de meeste nesten zijn opgezocht met de drone.
Vermeldenswaardig is nog dat bij de laatste zoekactie met drone naar jonge grutto's de drone werd aangevallen door een scholekster en toen ter aarde stortte met aanzienlijke schade. In het Agelerveld hebben ook drie paren veldleeuwerik gebroed en op de Ageleres een paar veldleeuwerik en gele kwikstaart.

Kievit

Het aantal broedparen in de beide gebieden telde 44 nesten, drie minder dan vorig jaar. Wel viel op dat de nesten meer verspreid lagen op meerdere akkers. Helaas is van de eerste legsels niet veel terecht gekomen. Vermoedelijke oorzaak landbouw werkzaamheden en predatie. De nesten zijn in het ei stadium al verongelukt. De meeste kieviten zijn daarom ook weer met een tweede legsel begonnen, net nadat de mais gezaaid was. Deze nesten zijn daarom ook bijna allemaal uitgekomen. Er liepen dan ook op enkele percelen veel kuikens rond onder de jonge maisplanten, wat dan een probleem gaf om ze te kunnen tellen. Hoeveel kuikens er groot zijn geworden, is dan ook moeilijk te zeggen om dat ze onder de grote maisplanten liepen. Het waren geen grote aantallen, omdat de kuikens veel last hadden van de droogte en stierven. De kieviten waren door de droogte ook snel vertrokken uit hun broedgebied.

Broedgeval van de gele kwikstaart op de Ageleres. Foto: Johan Drop.

Weinig jonge kieviten groot geworden vanwege de droogte. Foto: Johan Drop.

Grutto

De grutto heeft alleen op de Ageleres aan de Smidsweg gebroed, de nesten zijn met de drone opgezocht. De nesten van de grutto zijn soms moeilijk te vinden omdat ze diep onder het gras zitten. Maar de nieuwe camera onder de drone kon ze prima vinden. Beide nesten zijn uitgekomen en er zijn twee jonge grutto's vliegvlug geworden. In het Agelerveld liepen in het begin van het voorjaar drie paartjes grutto's rond, maar met het nestelen zijn ze vertrokken naar een perceel buiten het Agelerveld.

Scholekster

Alleen op de Ageleres hebben twee paartjes scholeksters gebroed. De nesten lagen op maisland. Of de nesten zijn uitgekomen en jongen groot zijn geworden is niet bekend. Tegen de tijd dat de eieren uit moesten komen was de mais al een halve meter lang dus moeilijk te zien of er kuikens waren.
Een tijd later toch nog twee jonge volwassen scholeksters gezien.

Wulp

Zowel op de Ageleres als het Agelerveld hebben vier paren wulpen gebroed. Al deze acht nesten lagen in het grasland en deze zijn bij het maaien van het gras goed gespaard gebleven. In het Agelerveld zijn twee nesten gepredeerd en twee nesten uitgekomen. Uit deze twee nesten zijn vier jongen groot geworden. Op de Ageleres waren ook vier broedgevallen, twee nesten zijn gepredeerd en twee nesten uitgekomen. Samen zijn er zes jonge wulpen vliegvlug geworden. Bijzonder is nog wel dat het paartje wulpen dat zijn nest hoog op de Zonneberg had, alle vier jongen hebben groot gekregen.

Vliegvlug jong van het succesvolle nest op de Zonneberg in Reutum. Het komt zelden voor dat alle vier nestjongen vliegvlug worden. Foto: Johan Drop.

Tureluur

Zowel op de Ageleres als in het Agelerveld hebben geen tureluurs gebroed. In het begin van het seizoen liep er in het Agelerveld een paartje rond, maar later niet terug gezien.

Afdeling Deurningen/Hengelo/Borne

Vergelijking resultaten 2022 en 2021

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kievit	56	56	56	56	45	38	11	4	7	19
Scholekster	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wulp	1		1		1		0			

Kievit

Het aantal broedparen van de kievit is gelijk gebleven aan vorig jaar, 56 stuks.
Van de gevonden legsels zijn er 45 uitgekomen maar hoe het verder is gegaan met de kuikens weten we niet. Er zijn wel zeven vliegvlugge jongen waargenomen.

Het eerste ei in Deurningen is gevonden door Werner Vollenbroek op 19 maart.
Bijzonder was een waarneming van een geringde kievit door Jos Visschedijk in de Bornse maten. Deze was 10 jaar geleden geringd tijdens een onderzoeksproject in Friesland.

Grutto en Tureluur

Zowel van de grutto als de tureluur zijn geen paartjes waargenomen.

Scholekster

Er is wel een paartje scholeksters waargenomen dat waarschijnlijk gebroed heeft op de sporthal maar er zijn geen jongen waargenomen.

Wulp

In een weiland aan de Gammelkerstraat is een wulpennest gevonden door de jagerscombinatie met een drone. Hierin zaten 4 eieren die zijn uitgekomen echter de vliegvlugge jongen zijn niet waargenomen.

Kleine Plevier

Op het maisland in de Dalmeden is door een oplettende agrariër tijdens de werkzaamheden een nest met 4 eieren gevonden. Deze zijn alle uitgekomen. Tevens is er op de Deurningeres nog een koppel van negen patrijzen waargenomen.

Kleine plevier met nestje uitgekomen jongen in de Dalmeden. Foto: Johan Drop.

Afdeling Saasveld

Vergelijking resultaten 2022 en 2021

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kievit	45	49		40		18			30	31
Grutto	2	3		0		2			2	2
Scholekster	2	4		4		2			0	5
Wulp	4	1		1		1			0	2
Tureluur	0	0		0		0			0	0

Inleiding

Dit jaar zijn we met een team van 4 personen voor weidevogelbeheer op pad geweest, twee met zeer veel ervaring en twee die het nog moeten leren. Ons gebied bestaat globaal uit twee delen: ten noorden van de Loodijk het Westerikkebroek en ten zuiden Boerenbroek.

Bij de eerste leg waren er veel kieviten, maar het aantal nesten leek beperkt. In een aantal gevallen werd, we overvallen doordat het land bewerkt werd ondanks toezegging dat dit vooraf bekend gemaakt zou worden. In juni was de bezetting van het team zeer laag, omdat drie van de vier met vakantie waren, zodat we de ontwikkelingen van het broedproces niet goed hebben kunnen volgen. In het algemeen inventariseren we de nesten niet als het bekend is dat het land voorlopig niet bewerkt zal worden, om het broedproces niet te verstoren.

We zijn één keer met een drone op pad geweest, maar geen nesten gevonden. Een mooie “bijvangst” was dat er een wielewaal gespot is met drie jonge pullen.

Ondanks de vele kieviten in het gebied waren er maar weinig nesten. Foto: Johan Drop.

Kievit

In het begin van het seizoen waren er veel kieviten zowel in Boerenbroek als Westerikkebroek. Er zijn relatief weinig jonge pullen gesignaleerd, waarschijnlijk omdat het erg warm en droog was. Bij de tweede leg waren er meer jonge kieviten, maar die waren lastiger te volgen, omdat het gewas meer groeide. Het aantal vliegvlugge kieviten was uiteindelijk vergelijkbaar met vorig jaar.

Ondanks dat de grutto regelmatig is gezien zijn er geen broedsels gevonden. Foto: Johan Drop.

Grutto

De grutto is in het Westerikkebroek regelmatig gezien en gehoord. We hebben geen nesten gevonden, maar uiteindelijk bleken er toch twee vliegvlug geworden. Dit was vergelijkbaar met vorig jaar.

Scholekster

Een scholekster paartje werd al vroeg in het seizoen gesignaleerd in Boerenbroek op het dak van de bunker. Echter we hebben geen jongen gezien en de verwachting is dat die er ook niet zijn geweest. Verder werden nog een aantal paartjes en een nest gezien, maar geen jongen.

Wulp

De wulp is wel een aantal keren in het seizoen gespot, zowel in Boerenbroek als Westerikkebroek, maar we hebben geen enkel nest gevonden en ook geen jonge wulpen. Vorig jaar waren er twee vliegvlugge wulpen.

Tureluur

Evenals vorig jaar hebben we geen tureluur gezien.

Afdeling Rossum

Vergelijking resultaten 2022 en 2021

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Kievit	44	58	54	50	24	29	27	30	26	19
Grutto	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Scholekster	4	5	3	3	0	1	3	2	0	2
Wulp	5	5	3	3	2	1	1	0	2	2
Tureluur	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0

Kievit

Het aantal broedparen van de kievit liep in 2022 met 14 paartjes terug tot in totaal 44 paren. Deze terugloop bedroeg dus meer dan 20%, een trend die zich al jaren voordoet. Soms is er een jaar met een kleine toename van het aantal broedparen maar over de lange termijn gezien gaat de kievitenstand gestaag achteruit. Dit zou kunnen betekenen dat over een bepaald aantal jaren deze weidevogelsoort alleen nog voorkomt in de gebieden met gesubsidieerd weidevogelbeheer. Een belangrijke oorzaak ligt in het feit dat de moderne weilanden hun waarde als broedgebied hebben verloren en de kievit massaal is verkast naar het maisland. Maar ook op de maislanden lukt het niet om voldoende jongen groot te krijgen en zo de populatie in stand te houden. Intensieve landbewerkingen op het moment dat de jongen uitkomen liggen hieraan ten grondslag.

De overlevingskansen van de kievit kuikens is veel te laag. Foto: Johan Drop.

Tureluur houdt de wacht vanaf een afrasteringspaal. Foto: Johan Drop.

Een mogelijke oplossing is het creëren van kruidenrijke randen om de graspercelen die grenzen aan maispercelen met een goede kievit bezetting. Deze insectenrijke grasranden bieden voedsel en beschutting waarmee de overlevingskansen van de kuikens aanmerkelijk groter worden. Ook moet er een oplossing komen voor de problemen die ontstaan met het inzaaien van vanggewas op de maispercelen op het moment dat hier kuikens lopen van kievit en patrijs maar ook jonge hazen. Oplossingen die niet op verenigingsniveau tot stand kunnen worden gebracht, maar waar in samenspraak met de boer andere regelgeving en subsidiëring door de overheid noodzakelijk zijn. Het afgelopen jaar werden in Rossum 54 legsels van de kievit gevonden waarvan er 24 uitgekomen zijn. Het aantal verstoringen bedroeg 27 legsels en voor zover waargenomen zijn 26 jonge kieviten vliegvlug geworden.

Grutto en Tureluur

Was er in 2021 van elke soort nog één broedpaar aanwezig, in 2022 zijn van beide soorten geen legsels meer waargenomen. Deze soorten zijn binnen enkele jaren alleen nog te zien in de gesubsidieerde weidevogelgebieden zoals bij Albergen, Geesteren en het Ottershagen bij Lattrop. Beide soorten zijn graslandbroeders waarbij ze, wanneer er jongen zijn, graag vanaf afrasteringspalen de wacht houden op predatoren. Het verdwijnen van deze palen zou medeoorzaak kunnen zijn van de achteruitgang van deze soorten. Wellicht is het mogelijk om als vereniging, in overleg met o.a. grondeigenaren, natuurorganisaties, waterschap enz. een regeling te treffen om bijvoorbeeld langs beekjes, sloten, aan grenslijn van percelen, op geschikte plekken houten palen te plaatsen zodat deze soorten op de hun bekende manier de nesten kunnen beschermen.

Scholekster

Ook dit jaar nam het aantal broedparen van de scholekster met 1 paar af, van 5 paren in 2021 naar 4 paren in 2022. Er werden 3 legsels waargenomen waarvan één legsel op het platte dak van de sporthal in Rossum. Een scholekster is een soort wadvogel en omdat op een groot plat dak van een gebouw vaak een plas water staat en bezaaid is met grint en kleine kiezelsteentjes, waant de scholekster zich aan het strand, vandaar dat die plek dikwijls gekozen wordt als broedplaats. Een scholekster voedt, in tegenstelling tot andere weidevogelsoorten, zelf zijn jongen zodat deze jongen niet zelf op pad hoeven voor voedsel. Voor zover bekend werden geen jongen vliegvlug.

Wulp

Het aantal wulpenparen wist zich te handhaven op 5 paren waarvan 3 legsels werden gevonden. Waargenomen is dat in ieder geval 2 jonge wulpen vliegvlug zijn geworden. Deze jongen komen niet na 1 jaar na geboorte maar na 2 jaren terug, pas dan zijn ze volwassen om te zorgen voor nageslacht. Hopelijk keren ze dan terug in de omgeving waar ze geboren zijn. Bekend is dat wulpen erg oud kunnen worden wel 15 tot 20 jaar. Hopelijk lukt dit ook de Rossumse wulpenjongen zodat we nog jaren kunnen genieten van de vroege voorjaarsjodel van deze prachtige vogel.

Reacties en info: secretariaat@nvwgdegrutto.nl