Landbouwers en veldwerkers hebben ook in 2021 weer veel tijd gestoken in het behoud van de weidevogels

DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING

Afdeling Weerselo

Vergelijking resultaten 2021 en 2020

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Kievit	20	22	20	29	14	18	6	11	17	24
Grutto	3	2	2	1	0	0	2	1	0	0
Scholekster	2	2	1	1	1	1	0	0	2	3
Wulp	4	5	2	2	1	2	2	1	2	2
Tureluur	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0

Kievit

In Weerselo werd de dalende trend in het aantal broedparen kieviten ook in 2021 niet gekeerd, al begint de daling wel af te vlakken. Dit jaar kwam uit op 20 broedparen, twee paartjes minder t.o.v. 2020.

Het voorjaar van 2021 was koud en nat. Nachtvorst bleef lange tijd aanhouden en met name de maand april was uitzonderlijk koud. Dit weerhield de kieviten er toch niet van om op tijd aan het broedseizoen te beginnen. Op 5 maart werd immers het eerste kievitsei in ons land gevonden in de omgeving van Utrecht. Het gevolg van de koude weersomstandigheden was dat de eerste legsels van de kievit niet echt succesvol waren. Voor de jonge kuikens was het te koud en voedsel was er bijna niet te vinden. De hoop werd daarom gevestigd op het tweede legsel. Deze latere legsels, bijna allemaal op maisland en nadat alle werkzaamheden op het land waren voltooid, waren succesvoller. Van de 20 gevonden nesten werden er zes verstoord of gepredeerd, dit komt neer op 30%. De overige 14 legsels werden wel met succes uitgebroed. Ook dit jaar was het aantal vliegvlugge jongen weer moeilijk in te schatten. De broedparen verplaatsten zich steeds met hun jongen en hielden zich ook vaak op in de snelgroeiende mais op de akkers. Met redelijke zekerheid hebben we kunnen vaststellen dat 17 kievitskuikens vliegvlug zijn geworden. Toch een mooi aantal gezien de moeilijke start van het broedseizoen.

Toch nog 17 kievitskuikens vliegvlug in Weerselo

Eén broedpaar meer in van de grutto in Weerselo

Grutto

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op 3 paartjes, een toename t.o.v. 2020 met één paartje. Twee broedparen bevonden zich zoals gebruikelijk in de omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. Nieuw was dit jaar een gruttopaartje in de omgeving van de Morsweg, waarvan het nest werd gevonden op een maisland. Ondanks de prima medewerking van de betreffende landbouwer werd het geen succes, het nest werd uiteindelijk gepredeerd. De 3 gruttopaartjes in het Weerselose hebben dit jaar helaas geen jongen voortgebracht.

Scholekster

Van de scholekster bleef het aantal broedparen, 2 stuks, gelijk aan voorgaand jaar. Weerselo heeft veel betere tijden gekend wat betreft het aantal paartjes. In 2013 bijvoorbeeld konden we nog 10 broedparen in Weerselo melden. Ook op landelijk niveau laten de aantallen scholeksters verontrustende cijfers zien. Met name in landbouwgebieden blijkt de achteruitgang van de scholekster dramatisch. Daar komt bij dat het broedsucces van de scholekster de laatste jaren zorgwekkend is te noemen. Steeds vaker worden scholeksters waargenomen op industrieterreinen waar ze broedgelegenheid zoeken op daken van fabrieken en hallen. Zo ook zocht een scholeksterpaar haar geluk op het industrieterrein in Weerselo. Het resultaat van dit broedgeval is niet duidelijk. Een ander scholeksterpaartje dat op een maisland broedde, bracht twee jongen groot.

Wulp

Voor heel veel mensen is de wulp de aankondiger van het voorjaar, zodra hij omstreeks februari al jodelend terugkeert. Aanvankelijk houden ze zich dan vooral op in de omgeving van het Zoekerveld, maar al snel trekken ze naar hun broedgebied. De muzikale aankondiging van de lente willen we natuurlijk graag ook in de toekomst blijven horen. Dat betekent wel dat er jaarlijks een aantal jongen vliegvlug moeten worden, willen wij van deze soort kunnen blijven genieten. De laatste jaren is het aantal wulpenparen in Weerselo redelijk stabiel gebleven, het aantal schommelt jaarlijks rond 4 a 5 broedparen. Dit jaar waren het 4 paartjes. Het aantal vliegvlugge jongen blijft echter jaarlijks achter bij het gewenste aantal. Ook dit jaar was dat weer het geval. Er wordt door vrijwilligers en boeren vaak veel tijd en inzet besteedt om het broedsel succesvol te laten zijn, maar toch gaat het dan nog mis. Hoe mooi is het dan, dat een wulpenpaar aan de Wolfsbergweg, uiteindelijk toch nog 2 jongen groot krijgt.

Tureluur

Dat het Zoekerveld in Saasveld in het vroege voorjaar aantrekkelijk is voor terugkerende steltlopers en/of weidevogels, is algemeen bekend. Vaak verblijven ze hier een tijdje en vertrekken ze op het moment dat het broedseizoen aanbreekt. Dit jaar zocht echter een Tureluurpaartje hier haar broedgeluk en met succes. Er werden twee jonge tureluurs vliegvlug.

Een broedgeval van de tureluur in het Zoekerveld

Afdeling Fleringen

Vergelijking resultaten 2021 en 2020

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Kievit	39	33	42	32	30	21	7	11	31	5
Grutto	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scholekster	3	3	3	1	2	-	1	1	4	0
Wulp	4	5	5	5	3	2		4		0
Tureluur	2	2	0	0	2	2	0	-	-	-

Kievit

Gelukkig is het aantal broedparen na meerdere jaren van achteruitgang weer een stuk gestegen. Het lijkt er bovendien op dat de kieviten zich clusteren in enkele gebieden. Vooral in de Weust en het Fleringerveld waren weer meer broedparen present dan in voorgaande jaren. Rond half maart begonnen de broedparen met de start van een legsel. De weersomstandigheden gedurende de verschillende fasen van het broedseizoen waren volkomen anders dan de voorgaande jaren. Er werden 40 legsels gevonden waarvan de vroegste een voltallig legsel op 20 maart door Hennie Lentferink.

Goede omstandigheden voor de tweede lichting kievitkuikens

De broedperiode verliep onder vaak koude omstandigheden met op sommige dagen talrijke sneeuw- en hagelbuien. De eerste broedsels kwamen in de tweede helft van april uit en ook de kuikens kregen te maken met zeer koude en voedselarme omstandigheden. Tijdens de eerste werkgang op de akkers werden meerdere nesten met eieren, maar ook nesten met net uitgekomen kuikens, verplaatst. De lage temperaturen en de regenval zorgden echter voor een voedseltekort voor deze kuikens en ondanks alle genomen moeite door de landbouwers en veldwerkers zijn er van de vroege broedsels nauwelijks jongen vliegvlug geworden. Gelukkig hadden de vogels zelf wel voldoende voedsel en energie voor een tweede leg. Andermaal werden nesten bij bewerking van de akkers gespaard en gemarkeerd door landbouwers en veldwerkers.

De kuikens van deze lichting hadden meer geluk. Waar in voorgaande jaren droogte en hoge temperaturen de weidevogels parten speelden, waren de akkers en weilanden nu voldoende vochtig. Tevens waren er ondanks de nog zeer bescheiden voorjaarstemperaturen voldoende insecten. Ook de trage grasgroei en een late maaidatum was gunstig voor de kievitkuikens.

Door de vrijwilligers werden dertig bijna vliegvlugge jonge kieviten geteld en dat was een opsteker t.o.v. de voorgaande jaren. Veel kuikens werden geteld in het gefaseerd beweide kruidenrijke grasland aan de Breemorsweg. Deze kuikens afkomstig van de maislanden in de Weust vonden hier kennelijk goede omstandigheden.

Scholeksters vonden een broedplek op de Dug-Out

Scholekster

Net als voorgaand jaar werden er drie broedparen waargenomen rond Fleringen. Door de regel zijn dit bouwlanden. Maar kennelijk aangemoedigd door de heersende rust vanwege de opgelegde coronamaatregelen, koos een broedpaar zijn heil op en rond het Sportpark ’t Reuvekamp. Regenwormen waren er kennelijk genoeg te halen op de voetbalvelden en ook nestgelegenheid werd gevonden. De Dug-Out van waaruit normaliter de tegenpartij hun spelers aanmoedigt werd goed bevonden als nestlocatie. Toch bleek deze keuze uiteindelijk niet handig. Na enige tijd te hebben gebroed werd het legsel helaas gepredeerd. Van de twee overige broedsels was er één succesvol met uitgekomen jongen. Van het derde broedsel is de uitkomst niet bekend.

Wulp

Met zijn kenmerkende jodelende zang kondigt de wulp voor veel mensen het begin van de lente aan. Maar toen op 9 februari de eerste wulp werd gemeld door Hennie Lentferink was er van lentegevoel weinig sprake. Integendeel, we zaten midden in een zeer winterse periode met sneeuwval en ijzige kou waarin ’s nachts het kwik daalde tot bijna min 15 graden. Totaal waren vier broedparen actief in de graspercelen rondom Fleringen. Helaas weer één broedpaar minder dan in het voorgaande jaar.

Door observatie vanuit de auto was rond half april de nestlocatie van drie broedparen gevonden zonder daarbij de nestplek te bezoeken. Eén broedpaar werd na enige tijd niet meer in de omgeving van de nestplek aangetroffen waardoor dit legsel als verloren kon worden beschouwd. Gelukkig begon dit paar een nieuw broedsel op een ander perceel in de directe omgeving. Het broedsel van het vierde broedpaar werd gevonden op 8 mei en werd na het maaien met een stroomafzetting afgezet. Helaas werd ook dit legsel om onduidelijke reden verlaten door het vrouwtje.

Ook het broedsel gevonden op de Fleringeres werd uitgerasterd. Van dit broedsel wisten drie kuikens uit te komen waarvan er uiteindelijk twee vliegvlug werden. Verder waren van een volgend legsel de drie kuikens al uit voordat er werd gemaaid. Net als de kuikens van de Fleringeres werden ook deze kuikens voortdurend lastig gevallen door groepen kauwtjes en zwarte kraaien. Eén jong is uiteindelijk vliegvlug geworden. Het legsel van het vierde broedpaar werd gevonden tijdens het grasmaaien. Drie jongen wisten uit te komen waarvan er twee vliegvlug werden. Totaal gingen er van de vier broedparen vijf jonge wulpen op de wieken. Een mooi resultaat wat perspectief biedt voor het komende jaar.

Eén van de vijf vliegvlugge jonge wulpen in Fleringen

Tureluur

De bezetting van de tureluur bleef net als voorgaand jaar beperkt tot één deelgebied. Twee broedparen werden hier aangetroffen en beide broedparen wisten een legsel uit te broeden. Ook werden beide broedparen gezien met respectievelijk twee en vier jongen. Omdat later in het seizoen van zowel de broedparen als de kuikens niets meer is vernomen lijkt het onwaarschijnlijk dat deze jongen vliegvlug zijn geworden.

Afdeling Rossum

Vergelijking resultaten 2021 en 2020

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Kievit	58	39	50	37	29	17	30	19	19	13
Grutto	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0
Scholekster	5	6	3	6	1	2	2	3	2	2
Wulp	5	6	3	4	1	2	2	2	2	1
Tureluur	1	3	1	2	1	2	0	0	0	1

Kieviten zijn massaal gaan broeden op het maisland

De kievit

De hier meest voorkomende weidevogel wist zich in 2021 behoorlijk te handhaven. Daar moet wel bijgezegd worden dat deze weidevogelsoort steeds meer de eigenlijk niet voor de hand liggende gebieden opzoekt. Zo verbleven van de in totaal 58 broedparen er 18, en dat is meer dan 30 %, in een gebied dat bestaat uit percelen met pas ingeplante dennen, coniferen, boompjes en struiken, welke behoren tot een boomkwekerij. Wel dient vermeld te worden dat in dit gebied ook een behoorlijke waterplas aanwezig is. Concentratie van meerdere, broedende kievitparen heeft ook als voordeel een betere verdediging tegen predatoren. De kievit verdwijnt wel steeds meer uit de vanouds bekende gebieden waar deze vogel in het verleden broedde. Weidevogels die vroeger echt in weilanden broedden zijn in de tweede helft van de vorige eeuw massaal verhuisd naar maisvelden omdat door veranderde grassoorten in weilanden het gras te egaal groen was en dus geen dekking meer bood. Daarna kwam de overheidsmaatregel om, in verband met stikstofuitstoot, jaarlijks op maisvelden het zogenaamde vanggewas te zaaien waardoor in het daaropvolgend voorjaar er een dik pak tamelijk hoog gras op maisvelden groeit en dus ongeschikt is voor de kievit.

Mede door uitbreiding van soorten beschermde predatoren, zoals marter en ook de ooievaar, gaat de populatie weidevogels achteruit. Als voorbeeld: In het Linderveld in Volthe, vroeger een rijk weidevogelgebied, broedden in het jaar 1997, dus ongeveer 25 jaar geleden, nog 15 paren kieviten, nu in 2021 geen enkel paar meer. Dit gebied wordt als het ware omgeven door ooievaarspalen met broedgelegenheid, welke voor het merendeel jaarlijks bezet zijn. Dit kan als een van de oorzaken van de achteruitgang van de kievit aangemerkt worden. Wat nog wel als goede, potentiële broedgebieden opnieuw geschikt gemaakt zou kunnen worden, zijn meerdere, in bezit van overheids-en terreinbeherende organisaties, gebieden die bewust verschraald zijn met als gevolg geen voedselaanbod, dus geen weidevogels meer. Door een gematigd bemestingsbeleid met stalmest toe te staan en eventuele beweiding door jongvee, schapen of pony's, zouden bodems weer voedselrijk kunnen worden voor de terugkeer van weidevogels. Van de 50 gevonden legsels zijn er 29 uitgekomen en 19 jonge kieviten zijn vliegvlug geworden.

Grutto

De harde achteruitgang van het aantal gruttoparen zette zich ook in 2021 onverminderd voort. In het Rossumse gebied was nog slechts één broedpaar aanwezig dat helaas geen vliegvlugge jongen heeft voortgebracht.

Scholekster

Ook dit jaar nam het scholeksters bestand af met één paar zodat er in totaal nog vijf paren aanwezig waren. Er werden drie legsels gevonden waarvan er één uitgekomen is. Dit leverde twee vliegvlugge jongen op.

Wulp

Deze van oudsher duin- en heidebroeder ging ook dit jaar weer met één paar achteruit zodat nog vijf paren overbleven. Van het ene en enige uitgekomen legsel zijn twee jongen vliegvlug geworden. Hopelijk komen deze jongen, als ze twee jaar oud zijn, terug om hier te broeden, zodat de wulpenstand niet nog verder achteruitgaat.

Tureluur

Het aantal paartjes tureluur ging dit jaar weer flink achteruit zodat nog slechts één paar overgebleven is. Van dit paartje is het legsel gevonden, echter voor zover bekend, werden geen jongen vliegvlug. Bijzondere waarneming: op 16 maart 2021 zat een aantal dagen een grote groep, op doortrek zijnde, kieviten in het Roderveld bij Rossum, in gezelschap van 20 à 25 goudplevieren. Een erg mooie en interessante waarneming.

Nog slechts één paartje grutto's in Rossum

Goudplevieren gespot in Rossum

Afdeling Deurningen/Hengelo

Vergelijking resultaten 2021 en 2020

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Kievit	56	22	56		38		4	3	19	8
Grutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scholekster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

De vervolglegsels van de kievit waren succesvol

De kievit

Het aantal broedparen van de kievit is afgelopen jaar sterk toegenomen, van 22 in 2020 tot 56 in 2021. De stijging van het aantal broedparen is mede tot stand gekomen door het uitbreiden van het zoekgebied en door toename van enthousiaste vrijwilligers.
Sommige nesten zijn opgezocht door gebruik te maken van een drone. Het eerste legsel werd gevonden door Werner Vollenbroek op 13 maart. Hij was hiermee de eerste melder binnen onze vereniging van het eerste gevonden broedsel. Van de 56 gevonden legsels zijn er 38 succesvol uitgekomen. Over hoe het verder is gegaan met de uitgekomen kuikens is weinig bekend.

Vooral van het eerste legsel zijn er geen vliegvlugge jongen waargenomen. Van het tweede legsel zijn er minimaal 19 vliegvlugge jongen waargenomen.

Scholekster

Net als vorig jaar zijn er geen broedparen van de scholekster waargenomen.
Wel was er een paartje aanwezig in Deurningen.

Wulp

Ook van de wulp is er geen broedsel gevonden. Er is in Gammelke wel een stelletje waargenomen maar helaas geen broedsel gevonden.

Afdeling Agelo

Vergelijking resultaten 2021 en 2020

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Kievit	47	43	45	43	38	34	9	2	31	32
Grutto	4	2	2	2	3	2	1	1	3	2
Scholekster	1	0	1	1	1	2	0	2	2	0
Wulp	8	5	8	5	3	5	5	2	6	10
Tureluur	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0

Inleiding

Het afgelopen jaar 2021 was het voorjaar weer heel anders dan de voorgaande drie jaren, toen het zeer droog was met warme periodes. Dit voorjaar was koud en nat en het werk op het land kwam laat op gang. De weidevogels daarentegen begonnen op de normale tijd te nestelen. Bij het maaien van de eerste snede liepen er al kuikens rond. Een enkeling had eerder gemaaid, waardoor de kuikens naar die percelen konden uitwijken. Het aantal broedparen liet dit jaar een lichte stijging zien. Bijzonder was, dat er in het Agelerveld tot aan half mei een groep van 40 kieviten rondhing die niet aan broeden zijn toegekomen. Er is intensief met de Drone gevlogen, met name om de wulp- en de gruttonesten op te zoeken.

Kievit

Het aantal broedparen liet een lichte stijging zien, met name in het Agelerveld. Op een perceel van 2 ha, waar het jaar daarvoor aardappels hadden gestaan, lagen 19 nesten. Dertien paren waren ongeveer tegelijkertijd gaan broeden en zes paren een week later. Twee dagen na uitkomst moest het land bemest worden. Op de dag van de bemesting zijn we ‘s morgens om half zes met vier man sterk kuikens gaan zoeken. Het was geen pretje, het bracht enorme verstoring onder de kieviten. We hebben 25 kuikens gevonden en naar een ander perceel gebracht. Helaas zijn er niet veel kuikens groot geworden. De andere zes nesten zijn goed gespaard gebleven bij het bemesten, spitten en aardappels poten. Verder in het Agelerveld broedden er op drie plekken drie tot vijf kieviten per plek, twee groepen op maisland en één groep op grasland. In dit gebied is geen tweede legsel gevonden Op de Ageleres broedden er minder kieviten dit jaar dan voorgaande jaren. Op een perceel maisland zijn de eerste zes legsels verloren gegaan, vermoedelijk door predatie en werkzaamheden. Alle paartjes zijn op hetzelfde perceel weer gaan broeden na de inzaai van de mais. Uit dit tweede broedsel zijn kuikens vliegvlug geworden. In dezelfde omgeving zag Johan Stevelink in de eerste week van augustus nog een jonge kievit, die nog niet kon vliegen, moederziel alleen rondlopen. Er waren geen andere kieviten meer aanwezig. Na een week was deze vliegvlug. Waarschijnlijk van een derde legsel.

Van de tweede broedsels zijn de kuikens uit meerdere broedsels vliegvlug geworden

Grutto

In het Agelerveld en op de Ageleres hebben vier paartjes grutto gebroed. Een paartje in het Agelerveld in het perceel met de drasplas, er is niet naar het nest gezocht. Er zijn ook geen kuikens waargenomen. De drie paartjes op de Ageleres hebben gebroed in een perceel waar agrarisch natuurbeheer op ligt, met uitgestelde maaidata en akkerranden. Deze drie paartjes grutto's hebben samen drie jongen groot gekregen.

Een foeragerend wulpen vrouwtje samen met reeds vliegend jong

Wulp

De wulp was dit jaar goed vertegenwoordigd rond Agelo, met acht broedparen. Vijf paartjes in het Agelerveld en drie op de Ageleres. Het was moeilijk om de nesten te lokaliseren, ze zaten erg verspreid op plekken waar je niet verwacht dat ze daar zouden nestelen. Joop Damink heeft er veel tijd ingestoken om de nesten te vinden. Hij vond er drie, één op maisland en twee in het weiland. Het nest op het maisland is in een mandje geplaatst om het te kunnen verplaatsen bij land werkzaamheden. Helaas, drie dagen na het ploegen was het nest leeg. Van de andere twee nesten is er één nest gepredeerd en uit het andere zijn twee kuikens vliegvlug geworden. De twee resterende nesten zaten in twee percelen van Aarnink. Het ene, in het perceel met de drasplas en uitgestelde maai datum, is helaas vermoedelijk gepredeerd. Het andere, aan de Paalmaatsdijk waar niet is gezocht, is bij het maaien verongelukt. Op de Ageleres hebben drie paartjes gebroed. Eén nest is gevonden door Rene Stevelink, op een perceel van de buurman aan de rand van zijn perceel. Op zijn perceel ligt agrarisch natuurbeheer. Dit paartje heeft twee jongen vliegvlug gekregen. Het tweede paartje had het nest aan de Zonneberg. Het nest is met een drone opgezocht. De kuikens waren enkele dagen oud toen het gras gemaaid moest worden. Door de goede medewerking van eigenaar Arends zijn de kuikens bij het maaien gespaard gebleven. Ook een voordeel was dat er aan de noordkant van het perceel een zes meter brede voedselakkerrand lag, in het kader van agrarisch natuurbeheer, waar de kuikens naartoe konden uitwijken. Dit paartje wulpen heeft twee jongen vliegvlug gekregen. Van het derde paartje dat op de es aanwezig was, is het nest niet gevonden, ondanks meerdere keren zoeken met de drone.

Scholekster

Aan de oostkant van de Ageleres heeft een paartje scholekster gebroed. Het nest lag op een maisveld aan de rand van een veld pompoenen. Ook hier zijn zeker twee grotere kuikens gezien. Het precies tellen van de jongen was hier ook moeilijk. Het gewas op het land was aardig gegroeid toen de kuikens er rondliepen.

Grote tureluurkuikens gezien in het Agelerveld

Tureluur

Alleen in het Agelerveld was een broedgeval van een tureluur. Ook in het perceel met de drasplas en uitgestelde maaidata. Ook naar dit nest is niet gezocht.

Wel zijn hier zeker twee grote kuikens gezien. Het aantal jonge tureluurs is moeilijk te tellen, omdat ze zich meestal ophouden in een diepe sloot.

Afdeling Saasveld

Vergelijking resultaten 2021 en 2020

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019	2021	2019
Kievit	49	20	40	26	18	11		15	31	12
Grutto	3	0	0	0	2	0		0	2	0
Scholekster	4	2	4	1	2	1		1	5	1
Wulp	1	3	1	2	1	1		1	2	1

Inleiding

In 2020 is er geen weidevogelbeheer gedaan, omdat er geen bemensing was. Dit jaar is er weer een weidevogel coördinator in Saasveld en zijn er twee veldwerkers. De cijfers van 2021 worden vergeleken met die van 2019, omdat er in 2020 geen tellingen zijn gedaan. Wij hebben ervoor gekozen zo weinig mogelijk het broedproces te verstoren, zodat we alleen het veld in zijn gegaan als dit noodzakelijk was, omdat het land op korte termijn bewerkt zou worden. Daarnaast is er een gebied welke wij niet mogen betreden.

Een aantal keren hebben wij stokken gezet, zodat de boer rekening kon houden met de nesten tijdens het bewerken. De boeren hielden hier ook rekening mee. Doordat het maaien vanwege de kou laat op gang kwam, was dit gunstig voor de broedende vogels. Eénmaal hebben we gebruik gemaakt van de drone om een wulpennest op te sporen, omdat de volgende dag gemaaid zou worden. Echter we hebben geen nest gevonden, maar het wulpen paar met twee jongen werd wel gesignaleerd in een naast gelegen weiland.

Kievit

Zo wel in Westerik als Boerenbroek waren dit jaar opvallend veel kieviten. Vroeg in het jaar waren al veel nesten, minimaal 15 in Westerik, met bijna allemaal 4 eieren. De uitkomst van deze legsels is echter twijfelachtig. Door het lange gras hebben we de nesten ook niet teruggevonden. Waarschijnlijk zijn ze niet uitgekomen door de kou. Later in het seizoen waren er nog veel nesten, maar doordat er veel kieviten waren en het gewas al hoog, was het moeilijk om de vliegvlugge jongen te tellen. In vergelijking met 2019 waren er zeer veel pullen.

Grutto

Na een aantal jaren zonder grutto, hebben we dit jaar weer genoten van het prachtige geluid van de grutto's. In Westerik hebben we drie paar grutto's gezien. We hebben geen nest gevonden, omdat ze of in een gebied broedden dat tijdens de broedperiode niet bewerkt zou worden of omdat het niet toegankelijk was voor ons. Aan het eind van het seizoen werden we verrast door een paartje met één jong en een paartje met twee jongen, welke twee uiteindelijk vliegvlug zijn geworden.

Wulp

De wulp heeft ons flink bezig gehouden in Boerenbroek. We zagen regelmatig één paartje maar konden geen nest vinden. Uiteindelijk vonden we het paartje met twee jongen die ook vliegvlug zijn geworden. Ten opzichte van 2019 is het aantal broedparen van 3 naar 1 gegaan. Hopelijk zijn het er volgend jaar weer meer.

Scholekster

In vergelijking met 2019 waren er twee keer zoveel broedparen, nu 4 in plaats van 2. Vroeg in het seizoen waren er twee broedparen in het Westrikkerbroek. Later in het seizoen was er zowel een broedsel in Westerik als in Boerenbroek. In Boerenbroek heeft hij waarschijnlijk zitten te broeden op de bunker van het schijnvliegveld uit de tweede wereldoorlog.

Tureluur

Al vele jaren zijn er geen (broedende) tureluurs. Dit jaar hebben we in Boerenbroek wel een tureluur gehoord, maar niet gezien. Onze hoop is nu gericht op 2022.

Het heldere 'gruttooo, gruttooo' was weer te horen in Saasveld

Reacties en info:secretariaat@nvwgdegrutto.nl