WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING

Afdeling Fleringen

Vergelijking resultaten 2010 en 2011:

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		GEVONDEN EIEREN		UITGEKOMEN EIEREN		VERSTORINGEN	
	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11
Kievit	57	52	67	51	247	172	>147	>79	23	19
Grutto	8	5	7	2	25	8	17	>4	1	-
Scholekster	9	8	8	5	25	13	>6	2	2	2
Wulp	5	2	4	1	15	-	>7	-	0	1
Tureluur	5	5	1	-	4	-	4	-	0	-

De kievit

Net als in 2010 daalde het aantal broedparen van de kievit het afgelopen jaar met 5 naar 52 broedparen. Alweer verloren we het afgelopen jaar daarmee bijna 10 % van de broedvogel populatie. Een structureel te lage jongen productie ligt ten grondslag aan een steeds maar dalende populatie. Te weinig broedparen zijn in staat om jongen vliegvlug te krijgen. Daarbij kwam de aanhoudende droogte in het voorjaar waardoor vooral op de droge zandgronden broedparen zijn weggetrokken naar vochtige gebieden. Ook door loslopende honden en het crossen met motoren en quads werden broedparen verjaagd. Ondanks alle winterperikelen werden al op 8 januari de eerste kieviten gemeld door B. Kemerink. Het was H. Lentferink die het eerste legsel wist te vinden op 21 maart. In totaal werden 67 legsels gevonden, 16 minder dan in 2010. Hierbij moet worden aangemerkt dat op graslanden nauwelijks is gezocht naar de legsels. Wanneer de graspercelen al voor de legperiode zijn bewerkt is het af te raden hier nog naar legsels te zoeken. Dit zou alleen maar de kans op verstoring door predatie in de hand werken. Het aantal van 19 verstoringen was lager dan in het voorgaand jaar. Door landbouwwerkzaamheden werden 2 legsels verstoord, 3 legsel werden verlaten en 13 legsels gingen verloren door predatie. Niet alle gevonden legsels werden op uitkomst gecontroleerd. Van de 144 eieren uit de gecontroleerde legsels kwamen 79 jongen uit. Een lage uitkomst waarbij ook maar in enkele gebieden jongen vliegvlug zijn geworden.

Naar de legsels van de graslandbroeders is nauwelijks gezocht

De grutto

De bij de kievit al genoemde droogte in het voorjaar zal ook van invloed zijn geweest op het aantal broedparen van de grutto. Of hiermee de daling van acht naar vijf broedparen is verklaard is echter te betwijfelen. Feit is wel dat al een aantal jaren achtereen niet meer als zes paartjes in Fleringen hebben gebroed en 2010 daarbij een positieve uitzondering was. Ook bij de grutto speelt een te lage reproductie een bepalende rol in het lage aantal broedparen. De grutto's hebben het afgelopen jaar gebroed in slechts één, uit twee deelgebieden bestaand gebied. In een ander afzonderlijk deelgebied werd aanvankelijk één broedpaar enige tijd waargenomen maar dit paartje heeft later, mogelijk door de droogte, het gebied weer verlaten. Er werden 5 legsels geconstateerd waarvan één legsel begin mei werd gemarkeerd. Om verstoring te voorkomen is later geen controle uitgevoerd en of hieruit ook jongen zijn gekomen is onduidelijk gebleven. Het verloop en de bescherming van de overige vier broedsels werd net als in voorgaande jaren door veldwerker en tevens boer gevolgd en uitgevoerd. Van alle 4 legsels kwamen er jongen uit maar helaas ging van één legsel alle 4 jongen verloren als gevolg van predatie door een buizerd. Gelukkig zijn er van de overige legsels minimaal 3 jongen vliegvlug geworden.

Ze worden nog maar zelden gezien; jonge scholeksters

De scholekster

Van de scholekster werden 8 broedparen geteld in 2011; één minder als in het voorgaande jaar. Van 5 broedparen werd het legsel gevonden waarin gezamenlijk het bescheiden aantal van 13 eieren werden geteld. Zowel het eerste als het laatste legsel werden gevonden door G. Timmers respectievelijk op 2 en 15 mei waarbij zoals gebruikelijk alle legsels werden gevonden op het maïsland. Van de vijf gevonden legsels mislukten er helaas twee en één legsel werd niet op uitkomst gecontroleerd. De broedresultaten van de twee uitgekomen legsels was met slechts één uitgekomen jong per broedsel zeer minimaal. Van alle acht broedparen werd slechts bij één ervan een vliegvlug jong gezien. De scholekster had in het verleden de reputatie van een felle nestverdediger die altijd wel enige jongen wist groot te krijgen. Dit beeld is inmiddels geheel achterhaald. Slechte voedselcondities in zowel de overwinteringsgebieden als de broedgebieden in combinatie met predatie van de legsels hebben ertoe geleid dat het aantal broedparen in snel tempo is afgenomen.

De wulp

Het aantal broedparen van de wulp was het afgelopen jaar weer op het niveau dat we doorgaans in Fleringen kunnen verwachten. Na een ongekend aantal van vijf broedparen in 2010 telden we het afgelopen jaar twee broedparen. De eerste wulpen werden waargenomen door B. Kemerink op 26 februari. De wulp heeft de reputatie als een soort die zijn legsel goed verborgen weet te houden. Dit werd het afgelopen jaar weer eens bevestigd en ondanks alle pogingen door de veldwerkers is het niet gelukt een legsel te vinden. Van één broedpaar ging hierdoor het legsel verloren tijdens het maaien. Van het tweede broedpaar is het twijfelachtig of er wel een broedpoging is ondernomen. Beide vogels werden in het broedseizoen op veel verschillende percelen waargenomen. Door de aanhoudende droogte is het aannemelijk dat dit broedpaar niet is gaan broeden.

De tureluur

Met vijf broedparen bleef de stand van deze kleine weidevogel jaar gelijk aan 2010. Er werden geen legsels gevonden maar daarvoor was er ook niet de noodzaak. De territoria lagen in bewerkte graspercelen en de verwachting was dat de legsels voor het maaien zouden uitkomen. In vier van de vijf territoria werden later alarmerende broedvogels aangetroffen waardoor aangenomen mag worden dat hier jongen zijn uitgekomen. Van meerdere stelletjes werden aan het eind van het broedseizoen bovendien vliegvlugge jongen gezien.

Afdeling Agelo

Vergelijking resultaten 2010 en 2011

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		GEVONDEN EIEREN		UITGEKOMEN EIEREN		VERSTORINGEN	
	‘10	’11	‘10	‘11	‘10	‘11	‘10	‘11	‘10	‘11
Kievit	78	61	84	68	315	222	184	117	20	37
Grutto	5	12	4	10	16	25	8	3	2	9
Scholekster	5	4	4	3	8	9	6	5	2	1
Wulp	7	5	4	3	13	11	4	2	3	3
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kievit

Vergeleken met het broedseizoen van 2010 daalde het aantal broedparen van 78 naar 61 in 2011 en het aantal gevonden legsels nam af van 84 tot 68, een daling van 19 %. Hopelijk zet deze trend zich niet door. Op de meeste broedplekken zien we dat de kievit de voorkeur geeft aan een maïsveld boven grasland. In het Agelerveld is echter het omgekeerde het geval. Daar zijn de meeste legsels gevonden op grasland. Van de 20 daar gevonden nesten lagen er 11 in het gras. Of op die plek de droogte en het voedselaanbod in het voorjaar een rol hebben gespeeld is niet duidelijk. In vroeger tijden waren de natte weiden daar wel altijd een belangrijk broedgebied voor de weidevogels. Vergelijken we het totaal van 222 in Agelo gevonden eieren met de 117 die er maar uitkwamen, dan zien we dat bijna de helft verloren ging. Het aantal gemelde verstoringen is dan ook erg hoog, nl 37 in dit jaar tegen 20 in 2010. De meeste verstoringen, 28 van de 37, vonden plaats in het terrein dat gelegen is tussen Kanaal Almelo- Nordhorn en de Wolfsbergweg. Later in het seizoen is daar een vos met jongen gesignaleerd, die volgens de veldwerkers zeker een aandeel zal hebben gehad in de vele predatiegevallen. De algemene klacht van de Agelose veldwerkers is dat er van de uitgekomen jonge kieviten zeer weinig vliegvlug zijn geworden. Er is melding gemaakt van slechts 3 vliegvlugge jongen in het Agelose.

De grutto

De grutto was in Agelo dit jaar in een verrassend aantal aanwezig. Waren er in 2010 maar 5 broedparen, in 2011 werd melding gemaakt van 12 á 13 broedparen. Opvallend was dat een groot weiland, gelegen tussen kanaal en Wolfsbergweg, de broedplaats was van maar liefst 8 á 9 broedparen. Het lijkt wel of ze zich samen sterk voelen. Deze concentratie heeft helaas niet het gehoopte effect gehad. Van de 25 daar gevonden eieren zijn er maar 3 uitgekomen. Eigenlijk niet zo vreemd, want het was in de omgeving waar ook bij de kieviten een hoge predatie werd geconstateerd. Het aantal broedparen stemde dit jaar tot tevredenheid, maar dat er slechts 7 vliegvlugge jongen zijn gesignaleerd was teleurstellend.

Verrassend veel broedparen grutto's in het Agelose

De wulp

Vergeleken met vorig jaar (7 broedparen) liet het aantal broedparen van de wulp weer een daling zien. Het broedseizoen van 2011 telde slechts 5 broedparen. Van drie broedparen werden nog 11 eieren geteld, maar hiervan is er niet één uitgekomen. De twee andere paren hebben hun broedpoging opgegeven. Gelukkig begon één van de drie genoemde paren aan een tweede legsel in de Ageler es. Daarvan kwamen de 4 eieren uit en werden de jongen vliegvlug. Later in het seizoen zijn in het gebied Wolfsbergweg nog drie stel wulpen waargenomen met samen 9 jongen. Of deze 9 daar ook ergens uitgekomen zijn is niet duidelijk.

De scholekster

Hiervan werden er 4 broedparen aangetroffen. De neerwaartse spiraal is nog niet doorbroken. De jaren 2008, 2009 en 2010 lieten nog aantallen zien van resp. 10, 9 en 5 broedparen. Er zijn 3 legsels gevonden met in totaal 9 eieren. Hiervan schijnen er 5 uitgekomen te zijn. Later zijn er echter geen vliegvlugge scholekstertjes gesignaleerd.

De tureluur

Van de tureluur is dit jaar, evenals in 2010, geen melding gemaakt. Het lijkt er op dat deze kleine weidevogel de Agelose dreven voorgoed links laat liggen als broedgebied. Wel is er dit jaar melding gemaakt van de aanwezigheid in het Ageler veld van een broedpaar van de veldleeuwerik, gele kwik en patrijs.

De Reutummer es

Jarenlang vormde de Reutummer es een witte vlek wat betreft het bijhouden van de stand van het aantal weidevogels. Er is natuurlijk door verschillende boeren uit dat gebied wel telkenjare omgekeken naar deze maïsveld- en graslandbroeders. De rechtgeaarde natuurliefhebber zal toch wel menig nest gespaard hebben.
In de komende jaren hopen we als weidevogelbeschermers dat vanuit Reutum zelf daar hulp bij komt van enkele geboren en getogen Reutummers. In dit weidevogelseizoen hebben zich namelijk een tweetal enthousiaste leden gemeld die samen met de agrariërs willen proberen ook op hun es weidevogels te behouden. Dit jaar is al een voorzichtig begin daarmee gemaakt. We hopen volgend jaar hiervan de aantallen te kunnen vermelden.

Afdeling Rossum

Vergelijking resultaten 2010 en 2011

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		GEVONDEN EIEREN		UITGEKOMEN EIEREN		VERSTORINGEN	
	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11
Kievit	126	117	113	83	401	298	186	110	56	51
Grutto	23	19	14	8	55	31	39	15	4	5
Scholekster	19	15	8	8	21	20	7	8	4	4
Wulp	6	8	2	5	8	20	4	12	1	2
Tureluur	16	11	11	1	42	4	31	4	3	0

De Kievit

Legselbescherming pas toegepast na het poten van de maïs

De stijging van het aantal broedparen van de kievit in 2010 kreeg in 2011 helaas geen vervolg. Het aantal broedparen daalde van 126 in 2010 naar 117 in 2011, een teruggang van ongeveer 7%. Het aantal gevonden legsels liep fors terug van 113 in 2010 naar 83 in 2011, een achteruitgang van maar liefst 26 à 27%, meer dan een kwart dus. Deze grote daling van gevonden legsels heeft deels te maken met een gewijzigde vorm van nestbescherming. Met name op die graslandpercelen waarop een contract is afgesloten tussen eigenaar en provincie voor wat betreft maaidata, wordt door veldwerkers nog slechts vanaf de (openbare) weg gecontroleerd , het zgn. monitoren. Dit houdt dus in dat de veldwerker deze percelen niet meer betreedt maar met enige regelmaat vanaf de zijkant controleert op broedende weidevogelparen. Het niet meer mogen betreden van deze zgn. contractpercelen is voorschrift van de provincie. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat dan op die percelen geen legsels worden gevonden. Dit verklaart voor een belangrijk deel de daling van het aantal gevonden legsels. Van de gevonden legsels werden er door allerlei oorzaken 51 verstoord, een verstoringspercentage van ca.17%. De eerste kieviten werden waargenomen op 1 februari door Frans Weusthof. Ook vond hij het eerste kievitlegsel en wel op 21 maart. Het laatste legsel werd gevonden op 13 juni door J. Groote Punt.

Een bijzonderheid was dat het afgelopen seizoen voor het eerst door één van de veldwerkers begonnen is met bescherming van legsels van kievit en scholekster op maïspercelen nadat de maïs gepoot was. Reden daarvan is dat jaren ervaring leerde dat van de eerste maïslandlegsels weinig tot niets terechtkomt, onder meer ten gevolge van de vele noodzakelijke werkzaamheden op maïsvelden juist in de broedperiode en ondanks goede medewerking van landbouwers en loonbedrijven. De eindresultaten van deze beschermwijze waren niet echt overweldigend, onder meer omdat nesten vanwege plensbuien in mei/juni niet op uitkomst gecontroleerd konden worden. Alle sporen waren letterlijk “gewist “. In totaal werden na het poten van de maïs 29 kievitenlegsels gevonden waarvan er zeker 13 zijn uitgekomen, 2 niet en de rest is onbekend om boven vermelde reden. Het aantal broedende scholeksters bedroeg na het maïspoten 6 paren waarvan 1 legsel met 4 eieren uitgekomen is, de rest is onbekend ook vanwege vermelde plensbuien.

Het monitoren van de broedparen is in het beheergebied De Benneker voldoende.

De Grutto

Het aantal gruttopaartjes liep terug van 23 in 2010 naar 19 paartjes in 2011, een achteruitgang van ca. 17%. Net als vorig jaar broedde de grutto in 4 deelgebieden waarvan “de Benneker” het grootste aandeel had nl. 12 broedparen oftewel 63% van het totaal. Het aantal gevonden legsels bedroeg 8, dat is 6 legsels minder dan in 2010. Dit heeft ook weer alles te maken met het zgn. monitoren van broedende vogels en dus niet meer het daadwerkelijk opzoeken van de nesten met eieren. De eerste grutto's werden in het Rossumse waargenomen op 14 maart door J. Groote Punt. Een bijzondere ervaring had veldwerker Bernard Pross uit Rossum. Hij zag dit voorjaar aan de Ootmarsumsedijk een grutto boven in de top van een ca. 8 meter hoge boom zitten om zijn pullen in de gaten te houden, de grutto vloog daarbij van de ene boomtop naar de andere. Bernard (een man van in de 80) schreef: “Dit heb ik nooit eerder meegemaakt “

De Scholekster

Het aantal broedparen van de scholekster liep terug van 19 in 2010 naar 15 in 2011, een achteruitgang van ca. 21%. Het aantal gevonden legsels bleef gelijk nl. 8 met een aantal van in totaal 20 eieren waarvan er slechts 8 uitkwamen. Ook dit jaar werd de helft van de gevonden legsels door verschillende oorzaken verstoord. De eerste scholeksters werden op 22 maart waargenomen door Frans Weusthof.

De Wulp

De stijging van het aantal broedparen in 2010 wist zich in 2011 voort te zetten, en wel van 6 naar 8 broedparen, een hoopvol gegeven. Deze slimme, sierlijke en een prachtig jodelend geluid voortbrengende vogel, die niet alleen bij vogelaars maar ook bij landbouwers een fijn voorjaarsgevoel oproept, is uit onze contreien in wezen niet weg te denken. Laten we daarom hopen dat de stijgende lijn van het aantal van deze soort zich zal weten voort te zetten, in ieder geval zal stabiliseren. Er werden 5 legsels gevonden met in totaal het maximum aantal eieren nl. 20, waarvan er 12 zijn uitgekomen. En nu maar hopen dat van deze 12 jonge wulpen er over 2 jaar een flink aantal zal terugkomen in hun geboortegebied. De eerste wulpen werden door B. Pross gezien op 10 maart.

12 jonge wulpen uitgekomen in Rossum

De Tureluur

De teruggang van het aantal paartjes van de tureluur was in 2011 opmerkelijk. Van de 16 paartjes in 2010 bleven slechts 11 broedpaartjes over in 2011, een achteruitgang van meer dan 30%. Van deze 11 broedparen, waarvan er 7 paren hebben gebroed in het gebied “de Benneker“, werd slechts 1 legsel gevonden. Dit heeft weer alles te maken met de wijze van lokaliseren van de nesten. Net als bij de grutto gebeurde dit in 2011 voor het eerst vanaf de “zijlijn “ door regelmatige monitoring oftewel “op afstand waarnemen“. Door deze manier van werken worden er geen sporen “getrokken” naar de nesten met de bedoeling predatoren op afstand te houden. Laten we hopen dat deze wijze van inventariseren een blijvend positief effect op de aantallen mag hebben.

Afdeling: Weerselo

Vergelijking resultaten 2010 en 2011

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		GEVONDEN EIEREN		UITGEKOMEN EIEREN		VERSTORINGEN	
	‘10	‘11	‘10	‘11	‘10	‘11	‘10	‘11	‘10	‘11
Kievit	66	77	89	97	335	357	203	229	36	35
Grutto	4	9	4	6	16	22	12	12	1	3
Scholekster	9	9	9	10	29	31	9	17	5	4
Wulp	4	7	4	8	10	27	5	17	2	3
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De Kievit

Na een drastische daling van het aantal kievit broedparen in 2010, nam het aantal in 2011 weer toe van 66 naar 77 broedparen. Daarmee is het aantal weer terug op het niveau van voor 2010. Opvallend is dat in Weerselo het aantal locaties met kieviten steeds verder afneemt, maar dat het aantal kieviten op de locaties, waar ze nog wel zitten, stabiliseert of zelfs licht toeneemt. Dat de kievit een voorkeur heeft aan een broedplaats op het maïsland boven het weiland blijkt ook weer dit jaar. Van de 97 kievitsnesten werden er 73 (75%) gevonden op maïsland en 24 (25%) op grasland. De eerste legsels worden gelegd rond de periode eind maart/begin april. De kieviten zitten dan ongeveer 2 weken te broeden als de werkzaamheden op het maïsland beginnen. Deze werkzaamheden, zoals mest-injecteren, ploegen, maispoten, zijn er in veel gevallen de oorzaak van dat het eerste legsel niet succesvol is. Deze trend was ook in 2011 weer waarneembaar, er zijn dan ook weinig kievitskuikens uit het eerste legsel vliegvlug geworden. De hoop werd daarom gevestigd op het tweede legsel. Deze latere legsels, begonnen op het moment dat alle werkzaamheden op het land waren voltooid, waren succesvoller en hebben relatief meer vliegvlugge kuikens opgeleverd. Het eerste legsel met 3 eieren werd in een weiland in Weerselo gevonden door H. Schepers op zondag 20 maart. Vier weken later, op maandag 18 april, werden 4 kuikens waargenomen. Helaas zijn deze kuikens verdronken in een diepe sloot, die was gegraven vanwege het draineren van een weiland. Ook het laatste legsel, met 4 eieren, werd op 8 juni gevonden door H. Schepers. Dit keer op een maïsland, waar de mais al redelijk hoog stond. Dit nest leverde twee vliegvlugge jongen op. In 2011 werden 35 nesten verstoord en/of voortijdig verlaten. Het verstoringpercentage kwam daarmee op 36% en was voor het grootste deel toe te schrijven aan predatie (51%). Uit de resterende legsels werden 229 jonge kieviten geboren.

Relatief meer kuikens vliegvlug van de tweede legsels

De Grutto

Hadden we al een aantal jaren te maken met een dalend aantal gruttoparen in het Weerselose. 2011 vormt daarop een uitzondering, want het aantal broedparen van de grutto nam toe van 4 broedparen in 2010 naar 9 broedparen in 2011. De grutto's bevonden zich op vier locaties waarvan 4 gruttoparen op één locatie. Op deze locatie is het broedseizoen succesvol verlopen. Omdat alle landbouwwerkzaamheden op het land al hadden plaatsgevonden en om verstoring te voorkomen, werden de nesten niet opgezocht. In goed overleg met de betreffende landbouwer werd het maaien van een groot gedeelte van het weiland enkele weken uitgesteld. Dit maakte het mogelijk dat, van de vier nesten, er drie gruttonesten uitkwamen. Eén nest werd helaas voortijdig verlaten. Op 18 mei werden voor het eerst alarmerende grutto-ouders waargenomen, daarmee vaststellend dat de eerste kuikens waren geboren. Het lange gras bood voldoende voedsel en dekking voor de kuikens. Na een aantal weken had het gras in de omliggende percelen inmiddels voldoende lengte bereikt, waardoor de grutto-ouders met hun jongen in een steeds groter gebied gingen foerageren. Dit maakte het mogelijk dat op 31 mei het gespaarde perceel kon worden gemaaid. Alle moeite werd uiteindelijk beloond met 7 vliegvlugge grutto-kuikens. Van één gruttopaar wisten zelfs alle 4 kuikens het luchtruim te kiezen. Dit is toch wel uitzonderlijk, omdat dat bijna niet meer voorkomt.

Ondanks hun waakzaamheid lukt het de afgelopen jaren maar weing scholeksterpaartjes om jongen groot te krijgen

De Scholekster

Van de scholekster bleef het aantal broedparen, 9 stuks, t.o.v. het voorgaande jaar op peil. Er werden 10 legsels gevonden, zonder uitzondering allemaal op het maïsland. Over het algemeen begint de scholekster wat later aan het broedseizoen. Dit jaar echter werd het eerste nest al gevonden op 29 maart door R. Blokhuis. Het laatste nest werd gevonden door H. Schepers op 29 mei. Het aantal gevonden eieren bedroeg in totaal 31 eieren. Van de 10 gevonden nesten gingen er 2 verloren door predatie en twee door landbouwwerkzaamheden. Het broedsucces van de scholekster is de laatste jaren zorgwekkend te noemen. 2011 week in dat opzicht niet af van voorgaande jaren. Het aantal vliegvlugge jongen kwam in 2011 slechts uit op 2.

De Wulp

Al in het vroege voorjaar, op 25 februari om precies te zijn, werden de eerste wulpen waargenomen. Na een dip in het aantal broedparen in 2010 (4 paartjes) herstelde zich het aantal in Weerselo weer naar 7 wulpenparen. Deze 7 wulpenparen bevonden zich allemaal in de omgeving van Gammelke. Het eerste legsel werd gevonden door P. Bleyenberg op 8 april. Dit bleek een zeer succesvol legsel, want alle 4 de jongen werden uiteindelijk vliegvlug. 2011 verliep in Weerselo goed voor de wulp. Van de 8 gevonden nesten met 27 eieren, kropen er 17 wulpenkuikens uit het ei. Hiervan werden er uiteindelijk 13 vliegvlug. Een mooi resultaat voor deze prachtige vogel.

De Tureluur

In het afgelopen jaren werd geregeld een paartje tureluurs waargenomen in de omgeving van Lemselo. In 2011 werd dit paartje niet meer waargenomen. Zij heeft zich waarschijnlijk verplaatst naar een gunstiger omgeving om te broeden.

Afdeling Saasveld

Vergelijking resultaten 2010 en 2011

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		GEVONDEN EIEREN		UITGEKOMEN EIEREN		VERSTORINGEN	
	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11
Kievit	46	44	56	53	219	164	155	95	16	21
Grutto	12	12	11	5	48	18	12	10	8	2
Scholekster	5	4	4	4	12	3	3	3	3	3
Wulp	5	6	3	4	12	10	4	4	2	3
Tureluur	1	0	1	0	4	0	0	0	1	0

De kievit

Het blijft maar dalen met de kieviten in Saasveld. Het aantal broedparen daalde niet zo hard als in het voorafgaande jaar. Dit jaar hadden we 44 broedparen. Twee broedparen minder dan vorig jaar. De meeste kieviten zitten in het Westerikkerbroek en Boerenbroek. Het aantal jongen dat vliegvlug werd was in beide gebieden erg laag. Wat zeker een grote rol heeft gespeeld is de droogte. In het algemeen kunnen weidevogels beter tegen een lange periode van regen dan tegen een lange periode van droogte. Dit geldt zeker voor kieviten op de maïslanden. Naast het feit dat veel kuikens tijdens landbouwwerkzaamheden zijn ondergewerkt, konden de overgebleven kuikens onvoldoende voedsel vinden op de kurkdroge akkers. Doordat kuikens bij voedselschaarste minder alert zijn, vallen ze vaak ten prooi aan predatoren. Het aantal nestverstoringen lag dit jaar 10% hoger dan vorig jaar. De droogte zal ook hier zeker een rol in hebben gespeeld. Daarnaast kregen we in het Westerikkerbroek ook nog eens te maken met eierrapers. Er werden zeker 5 kievitsnesten leeggehaald. Verantwoordelijk voor de overige verstoringen waren: landbouwwerkzaamheden(6), predatie(10). Het eerste legsel en het laatste legsel werd respectievelijk op 24 maart en 25 mei gevonden door L. Rouhof.

De Grutto

Voor de grutto was 2011 een dramatisch jaar. Er is geen enkel gruttokuiken vliegvlug geworden. Het aantal broedparen grutto's in Saasveld was in 2011 gelijk aan dat van 2010, namelijk 12 broedparen. Er werden 5 nesten gevonden waarvan 3 nesten in Boerenbroek en 2 nesten in het gebied rondom de Postweg. Van de overige broedparen zijn de nesten niet gevonden. Van de 5 gevonden nesten zijn 3 nesten succesvol uitgekomen. Helaas zijn van deze succesvol uitgekomen nesten geen kuikens vliegvlug geworden. Het eerste grutto legsel werd op 18 april gevonden door L. Rouhof en het laatste gruttonest tijdens het maaien op 24 mei door M. Blenke. Omdat nu al enkele jaren achtereen nauwelijks kuikens vliegvlug zijn geworden in de gebieden rondom Saasveld, moet in de nabije toekomst gevreesd worden voor het behoud van deze prachtige en statige weidevogel in dit evenzo mooie landschap.

Hoewel er wel een aantal legsels succesvol uitkwamen werden helaas geen jongen vliegvlug

De scholekster

Het aantal broedparen scholeksters daalde dit jaar naar 4. Van deze broedparen werd ook het legsel gevonden. Jammer genoeg werden van deze 4 gevonden legsels, 3 legsels verstoord. Oorzaak van de verstoring was predatie. Gelukkig zijn er van dat ene succesvol uitgekomen legsel nog 2 kuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel met 4 eieren werd op 6 april gevonden door J. Schabbink. Het laatste legsel op 8 mei door L. Rouhof.

De wulp

Gelukkig kunnen we voor dit jaar een toename melden van de wulp. Dit zeer waarschijnlijk als gevolg van het succesvol vliegvlug worden van kuikens in de voorgaande jaren. Het totaal aantal broedparen wulpen bedroeg 6 waarvan 4 nesten werden gevonden. Het eerste nest werd op 2 april gevonden door L. Rouhof. Het laatste op 17 april gevonden door L. Vollenbroek. Alle vier nesten werden gepredeerd, waarvan 1 nest door de vos en 3 nesten door kraaien. Kortom, ook van de wulp zijn in 2011 geen kuikens vliegvlug geworden.

Afdeling Deurningen/Hengelo

Vergelijking resultaten 2010 en 2011

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		GEVONDEN EIEREN		UITGEKOMEN EIEREN		VERSTORINGEN	
	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11	'10	'11
Kievit	34	41	49	47	186	161	98	117	24	10
Grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scholekster	4	4	4	4	11	9	11	6	0	2
Wulp	3	1	1	0	4	0	4	0	1	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kievit

Na een terugval van het aantal broedparen kieviten vorig jaar kon dit jaar weer een toename van deze mooie weidevogel gemeld worden. Met 7 broedparen meer kwam het totaal uit op 41 broedparen. Een toename van 21 %. Helaas zijn ook in de omgeving van dit kerkdorp weinig kuikens vliegvlug geworden. Volgens schatting zijn er ongeveer 15 kuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel werd op 25 maart gevonden door het duo Horsthuis/Veldhuis en het laatste werd op 30 mei gevonden door Harry Koopman. Opmerkelijk was dat er evenals in 2011 weer een legsel is gevonden met eieren van een afwijkende kleur, namelijk blauw. Destijds was de vinder Hennie Horsthuis en werd het nest uiteindelijk gepredeerd. Dit jaar was Harry Koopman de vinder van dit bijzondere legsel dat ook nog eens succesvol uitkwam. Of de kuikens ook vliegvlug zijn geworden is niet bekend. De predatie van het aantal nesten was dit jaar laag. Wat de hoofdoorzaak is van het geringe aantal vliegvlugge kuikens, is niet duidelijk geworden. Maar ook hier zal het droge voorjaar een grote rol hebben gespeeld.

De scholekster

Het aantal scholeksters dit jaar is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven, namelijk 4 broedparen.
Drie nesten werden gevonden op het maïsland. Het nest van het 4e broedpaar werd gevonden op het platte dak van een gebouw. Eén nest op het maïsland werd gepredeerd. De uitgekomen kuikens van de scholekster op het platte dak hebben het helaas niet overleefd. Ze werden dood op de begane grond gevonden. Van de succesvol uitgekomen legsels op het maïsland zijn er waarschijnlijk 2 pullen vliegvlug geworden. Het eerste legsel(12 mei) en het laatste legsel(20 mei) werd gevonden door Harry Koopman.

Het enige broedpaar wulpen was succesvol

De wulp

De stand van het aantal broedparen wulpen is dit jaar gedaald van 3 naar 1 broedpaar. Ondanks dat het nest niet werd gevonden zijn de eieren van dit wulpenpaar toch succesvol uitgekomen. Later in het seizoen werd het ouderpaar gesignaleerd met kuikens. Het is onbekend of er wulpenkuikens vliegvlug zijn geworden.

secretariaat@nvwgdegrutto.nl