WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2016 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO

Afdeling Deurningen/Hengelo

Vergelijking resultaten 2016 en 2015

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kievit	20	11	20	11	-	-	-	-	-	-
Grutto	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Scholekster	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-
Wulp	1	1	1	0	1	-	0	-	?	-
Tureluur	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

De kievit

De stand van de kievit heeft zich enigszins hersteld in 2016. Door de vele wandelaars met loslopende honden in de Dalmeden is er slechts een klein gedeelte van dit gebied geschikt gebleven als broedgebied voor de kievit. Het aantal verstoringen bij de kievit was dit jaar gering

De grutto / tureluur

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van de grutto en tureluur waargenomen.

Wulp plaatstrouw aan het broedgebied

.

De wulp

Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broed al enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied. Het legsel werd in overleg met de eigenaar beschermd en hiervan zijn de jongen goed uitgekomen. Door de veldwerkers werden later in het seizoen jonge wulpen gezien.

De scholekster

Het aantal broedparen was met drie gelijk aan het voorgaande jaar. Hieronder weer een scholekster op het platte dak van een gebouw in Deurningen. Van de twee maislandbroeders werd het legsel gevonden.

Afdeling: Fleringen

Vergelijking resultaten 2016 en 2015:

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2016	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**	**2016**	**2015**
Kievit	47	47	41	46	26	37	12	9	18	39
Grutto	5	5	4	1	1	0	3	1	0	0
Scholekster	4	5	4	6	0	2	3	2	0	onbekend
Wulp	3	4	4	5	1	3	3	3	0	6
Tureluur	5	5	3	1	2	3	1	1	5	>1

De kievit

Door het zachte winterweer bleven veel doortrekkende kieviten bij onze weidegronden en akkers hangen. Ze zijn dan onderweg van de koudere gebieden in Scandinavië en Siberië naar warmere streken in Zuid-Europa. De vogels hoeven niet verder te trekken omdat de temperaturen voor hen aangenaam zijn en er voldoende voedsel is op de akkers en weilanden. Onze broedvogels overwinteren in zuidelijke oorden en keren vanaf half februari terug in het broedgebied.
Het aantal van 47 broedparen dat het afgelopen jaar in Fleringen terugkeerde was gelijk aan dat van 2015. Er werden wel een flink aantal legsels minder gevonden of beter gezegd opgezocht. Veel graslandlegsels werden bewust niet opgezocht omdat de werkzaamheden op deze graslanden voor het broedseizoen al waren uitgevoerd. De rust op deze weilanden voor de vogels heeft er niet toe geleid dat er veel kuikens groot werden. Het lijkt erop dat veel legsels op de graslanden ofwel niet uitkomen of dat jonge kuikens niet overleven. De meeste jonge kieviten werden gemeld vanuit de maislanden. Belangrijk hierbij is dat er dekking is voor de jonge kuikens zoals ruige slootkanten.

Meeste jonge kieviten gemeld vanuit het maisland

Van de 41 gevonden legsels werden er 12 verstoord. Op één uitzondering na werd als oorzaak predatie aangegeven.
Uiteindelijk werden er totaal 18 kievit kuikens geteld tussen de twee en drie weken oud. Maar het blijft lastig in te schatten hoeveel er uiteindelijk vliegvlug werden.

De grutto

De aftrap van het broedseizoen van de grutto begon in Fleringen op 28 maart toen de eerste grutto's werden gemeld door B. Kemerink. Maar het broedseizoen zou teleurstellend verlopen. Er werden 5 broedparen geteld, gelijk aan dat van het jaar ervoor en verdeeld over 3 deelgebieden. Alle broedparen kregen te maken met predatie van eieren of jongen. Het eerste legsel werd gevonden op 14 april door B. Kemerink. In twee deelgebieden met één broedpaar werd het legsel gepredeerd waarbij 1 broedpaar later ook niet meer werd aangetroffen in het gebied. Het derde deelgebied had een bezetting van 3 broedparen waarvan de legsels werden gevonden. Twee legsels hiervan werden na verloop van tijd gepredeerd terwijl het derde legsel met succes werd uitgebroed. Tijdens het maaien van het perceel vonden de kuikens dekking in het naastgelegen weiland maar dit mocht uiteindelijk niet baten. Na enige tijd werden alleen de broedvogels gezien maar was er van de kuikens geen spoor meer te ontdekken.

De scholekster

Het aantal scholeksters blijft maar dalen. In 2016 werden er slechts vier broedparen geteld; weer een minder dan in het voorgaande jaar. Gezien de slechte broedresultaten lijkt het er niet op dat het volgend jaar beter zal zijn. Van de vier gevonden legsels is de uitkomst van een legsel onzeker. De overige drie legsels werden alle verstoord. In een dorp als Tubbergen broeden momenteel meer scholeksters dan in het buitengebied van Fleringen. De vele platte grindaken op het industrieterrein en ook in het centrum zijn voor scholeksters een aantrekkelijke broedplek. Waar de scholekster in het buitengebied alleen maar in aantal afneemt, brengen de ouders op de platte daken meer jongen groot dan nodig is om de dorpse populatie in stand te houden.

De wulp

Samen met de kievit zijn de wulpen weer vroeg in het voorjaar terug op hun broedgebieden. Het afgelopen jaar werd het eerste koppel gemeld op 29 februari door B. Kemerink. Uiteindelijk werden drie broedparen geteld en dat was een minder dan in 2015. Twee legsels werden vanaf afstand opgezocht met de telescoop. Bij een broedpaar deed een hoogzit als uitkijkpost goede diensten en kon de broedende vogel snel en onopgemerkt worden getraceerd. Dit heeft niet kunnen voorkomen dat het legsel in een later stadium werd gepredeerd. Het tweede broedpaar was hetzelfde lot beschoren. Dit paar ondernam hierop een tweede broedpoging in een verderop liggend perceel. Dit legsel werd gevonden tijdens het grasmaaien waarna in overleg met de landbouwer een flink stuk grasland om het legsel is blijven staan. Uit voorzorg werd het stuk grasland vervolgens afgezet met een schrikdraad afrastering. Om onverklaarbare reden werd het legsel enkele weken nadien door het broedpaar verlaten. Een forse tegenslag, temeer omdat de eieren op het punt van uitkomen stonden.

Het legsel van het derde broedpaar werd gevonden door de oplettende agrariër tijdens het grasmaaien. Om dit legsel, met drie net uitgekomen jonge wulpen, werd vervolgens netjes heen gemaaid. Gemaaide percelen zijn echter vaak heel aantrekkelijk voor tal van predatoren als reigers, zwarte kraaien en buizerds. Als er dan geen dekking is voor de jonge kuikens zijn deze bij voorbaat al kansloos. Zo ook in dit geval waarbij al enkele dagen na het uitkomen geen spoor meer was te ontdekken van de wulpen met hun jongen.

Alarmerende tureluur waakzaam over de jongen in het gemaaide gras

De tureluur

Het aantal broedparen van de tureluur in Fleringen bleef stabiel. Net als in 2015 telden we vijf broedparen. Daarmee is Fleringen samen met Rossum een afdeling waar de tureluur zich vooralsnog weet te handhaven. Ieder jaar opnieuw weten enkele paartjes wel jongen vliegvlug te krijgen. Gelukkig lukte dat het afgelopen jaar ook weer. Echter niet voor het eerste legsel dat werd gevonden en gespaard met het grasmaaien. Hier werd een grote pol grasland niet gemaaid om het paar niet te verstoren. Helaas mocht dit niet baten en werd het legsel enige tijd later gepredeerd aangetroffen. Verder werden van twee broedparen geen legsels geconstateerd en ook waren er geen indicaties van alarmerende oudervogels. Van twee broedparen kwamen de legsels wel uit. Met gezamenlijke inzet van boer en veldwerkers werden de jongen tijdens het maaien uit de percelen verdreven met het plaatsen van plasticzakken. Gelukkig werkten de jongen die inmiddels al bijna twee weken oud waren goed mee en werden na de maaiwerkzaamheden totaal vijf pullen geteld.

Het uiteindelijke resultaat bij de weidevogels was - uitgezonderd de tureluur - bedroevend. Een mooie opsteker het afgelopen jaar was het aantal succesvolle patrijzen paartjes. Gedurende de zomer, najaar en winter werden door verschillende waarnemers meerdere kluchten patrijzen waargenomen. Frans Stopel wist deze mooie groep veldhoenders vast te leggen.

Afdeling: Weerselo

Vergelijking resultaten 2016 en 2015

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kievit	28	25	40	29	17	17	23	12	18	7
Grutto	5	7	5	7	1	2	4	5	2	4
Scholekster	3	3	1	3	0	2	1	1	0	2
Wulp	5	6	4	6	2	1	2	5	2	0
Tureluur	1	0								

Het is algemeen bekend dat een structureel te lage productie van vliegvlugge jongen ten grondslag ligt aan de dalende broedpopulatie van de weidevogels. Om de weidevogels te kunnen behouden voor ons nageslacht zullen we nog veel gerichter en specifieker moeten gaan beschermen. Voorbeelden hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand, alleen opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk en goed overleg is nodig met de agrariërs over te verrichten werkzaamheden op de akkers en te nemen maatregelen.

De kievit

In tegenstelling tot voorgaande broedseizoenen daalde het aantal broedparen van de kievit in het Weerselose eens een keer niet. Voor het eerst in een groot aantal jaren werd de dalende trend doorbroken en steeg het aantal in 2016 t.o.v. 2015 met drie van 25 naar 28 broedparen. Hopelijk zet zich dit ook de komende jaren door. Om een indruk te geven van de achteruitgang van het aantal kievitsparen: in 2011 konden we nog 77 paartjes in het Weerselose registreren. De eerste kievitsnesten werden gevonden door Harrie Weiden en wel op 22 maart op een weiland aan de Legtenbergstraat. Dit weiland had een grote aantrekkingskracht op de kieviten vanwege de vrij open structuur en omdat er vaste stalmest op werd uitgereden. Harrie vond er in eerste instantie drie nesten met in twee nesten drie eieren en in een nest vier eieren. Op latere data werden er op dit weiland nog meer nesten gevonden, te weten negen kievitsnesten en één gruttonest. Op 21 april werden de eerste kuikens op het weiland waargenomen. Net als voorgaand jaar bevonden zich ook weer een aantal broedparen kieviten op het industrieterrein De Echelpoel in Weerselo. Dit is een nat en open terrein met kruidige vegetatie, maar door bouwactiviteiten neemt het in omvang echter snel af. Toch zagen nog vier broedparen kieviten kans er te broeden en zelfs twee jongen groot te brengen. Een andere opvallende broedplek was een crossterrein voor motoren aan de Lemselosestraat. Helaas zonder succes, want de twee nesten, die Ronald Blokhuis hier vond, werden voortijdig verlaten. Van de 40 gevonden legsels werden er 27 gevonden op maïsland, 9 op grasland en, zoals al aangegeven, 4 op het industrieterrein. De eerste legsels worden nog wel eens gevonden op grasland, maar latere legsels zijn bijna altijd te vinden op bouwland. Het verstoringspercentage was in 2016 ook weer relatief hoog. In 2015 ging 41% van de nesten verloren, in 2016 was dit 57%. 21 nesten gingen verloren door predatie en 2 nesten werden verlaten. De overige 17 gevonden en gespaarde nesten, met in totaal 57 eieren, kwamen wel uit. Zoals ieder jaar, was het ook dit jaar weer moeilijk in te schatten hoeveel kuikens uiteindelijk vliegvlug zijn worden. De broedparen verplaatsten zich steeds met hun jongen en hielden zich ook vaak op tussen de snelgroeiende mais op de akkers. Het aantal vliegvlugge jonge kieviten wordt dit jaar geschat op achttien.

Totaal 17 kievitsnesten uitgekomen in Weerselo

De grutto

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op vijf (in 2015 was dit nog zeven). Vier broedparen bevonden zich in de omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergerstraat en een paartje aan de Zomerdijk. Op 19 april vond Henk Schepers aan de Zomerdijk een legsel met vier eieren. In goed overleg met de agrariër werd besloten een flink stuk gras te laten staan. Helaas zonder succes. De grutto heeft nog lange tijd gebroed, maar rond de uitkomstdatum was het nest verdwenen.

Op het terrein rond de Wolfsbergweg-Legtenbergerstraat vond Harrie Weiden op 24 april het eerste legsel met vier eieren. In totaal zijn er vier nesten gevonden met daarin zestien eieren. Na verloop van tijd bleken drie nesten te zijn verdwenen. Het vierde nest werd met succes uitgebroed, gezien het feit dat op 16 mei het ouderpaar luid alarmerend waakte over de kuikens. De inschatting is dat hiervan twee jonge grutto's vliegvlug zijn geworden.

De scholekster

Net als de kievit, gaat het ook de scholekster niet voor de wind. Van de scholekster werden er in Weerselo drie broedparen geteld in 2016; gelijk aan het aantal in 2015. Van twee paartjes werd geen nest getraceerd. Op 18 mei vond Henk Schepers van het derde paartje een legsel met vier eieren. Omdat dit nest voortijdig werd gepredeerd, werd 2016 voor de scholekster een teleurstellend jaar.

De wulp

Al in het vroege voorjaar, op 26 februari om precies te zijn, werden de eerste wulpen waargenomen in de omgeving van hun broedgebied. Het aantal broedparen wulpen was de laatste jaren vrij stabiel (zes paartjes), maar in 2016 bleef de teller steken op vijf paartjes. Ook dit jaar weer de meeste paartjes (drie) in de omgeving van het Zoekerveld. Het eerste legsel met vier eieren werd op 13 mei gevonden in een weiland aan de Weerselerveldweg door Annemarie Lutke Veldhuis. Ook de andere twee nesten werden door Annemarie gevonden. Van de drie gevonden nesten, met in totaal twaalf eieren, gingen er twee verloren door predatie. Het derde nest werd wel uitgebroed, maar de jongen waren al snel verdwenen. Waarschijnlijk was een vos hiervan de oorzaak, omdat deze regelmatig in deze omgeving werd gesignaleerd.

Succesvoller was een wulpenlegsel in de omgeving van Gammelke. Peter Bleijenberg vond hier twee nesten, waarvan er een met succes werd uitgebroed. Twee jongen konden door Peter worden geringd en kozen uiteindelijk het luchtruim.

De tureluur

In Lemselo is een paartje tureluurs tot broeden gekomen, het nest werd echter niet gevonden. Gezien het alarmeren van de oudervogels, is het zeker dat het broedsel succesvol is uitgekomen en dat ook een aantal jongen vliegvlug zijn geworden.

Afdeling: Agelo

Vergelijking resultaten 2016 en 2015

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kievit	30	32	30	31	25	25	7	6	?	10
Grutto	6	4	2	3	2	2	4	2	?	4
Scholekster	5	3	3	1	3	0	?	1	?	3
Wulp	5	5	2	2	2	2	?	3	?	3
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kievit

Het weidevogelseizoen kwam heel langzaam op gang en deed daarmee de vrees voeden dat het seizoen 2016 ging voortborduren op de slechte jaargang 2015. Het aantal aanwezige broedparen in het overzicht lijkt met een daling van twee (32 naar 30) nog mee te vallen, maar in werkelijkheid is ze groter. Door het in 2016 meetellen van enkele stukken grasland die al een aantal jaren beheersgebied zijn, konden we het aantal van dertig halen. Zonder dat gebied, met een late maaidatum, waren we uitgekomen op zeven broedparen minder. In feite moeten we dan wel spreken van een slecht kievitenjaar. Een favoriete plek om te broeden was dit jaar een nat, ruig stuk bouwland aan de Wolfsbergweg waarop een groenbemester gezaaid was. Het kon pas laat bewerkt worden en zo kreeg een negental kievitenpaartjes de gelegenheid om de eieren uit te broeden. Aan de kruimelige schaalresten was te zien dat ze uit waren, maar een jong is niet waargenomen. Enkele koude natte dagen zullen samen met predatoren daarin wel een rol hebben gespeeld. Evenals in andere jaren bleek ook weer de trek van de kievit naar de maisvelden, waarbij de vele bewerkingen voor problemen zorgen.

Broedvogel van de maislanden; de scholekster

Gelukkig zijn er nog tal van boeren die hun best doen om de nesten te “omzeilen”. Het is echter teleurstellend dat er later in het seizoen nauwelijks vliegvlugge jongen werden waargenomen.

De grutto

Dit jaar was het aantal gruttopaartjes tot onze verrassing zes. Dit aantal werd niet alleen opgespoord door onze veldwerkers, maar ook enkele landbouwers met een hart voor weidevogels wisten in welke graspercelen de vogels volgens hen nesten hadden. Weliswaar zijn niet alle nesten op tijd gevonden. In enkele gevallen werd de broedplaats helaas pas duidelijk na het maaien. Dan liepen de oudervogels doelloos rond te foerageren. Aan de Steenmatenweg kwam een legsel uit, waarvan later nog twee jongen werden gezien. Aan de Wolfsbergweg lagen een grutto- en wulpennest niet ver van elkaar. Het gruttonest werd al snel verstoord, waarschijnlijk, gelet op de achtergebleven veren, door een vos.

De scholekster

Van de scholekster werden er vijf broedparen geteld. Bij drie nesten, met in totaal zeven eieren, zijn later jongen waargenomen. De andere nesten zijn niet opgespoord. Deze twee broedparen scharrelden begin juli nog steeds bij een perceel mais. Aangenomen wordt dat de jongen in het maisveld zaten.

De wulp

De wulp bleef met een aantal van vijf broedparen op het peil van vorig jaar. Het bleek echter moeilijk de exacte broedplek te vinden in het snelgroeiende gras. Op een weiland achter het kanaal Almelo-Nordhorn wist Leonard Rouhof een wulpennest met drie eieren te vinden, enkele dagen voor het maaien. Het lag dicht bij het hierboven genoemde gruttonest. Het wulpennest werd gemarkeerd en de boer werd van de situatie op de hoogte gebracht. Hij liet een strook gras staan. Om niet méér te verstoren dan echt nodig was, werd het nest pas een flinke tijd later weer geïnspecteerd. Het nest bleek toen te zijn verlaten. De drie eieren lagen er nog in. Het wulpenlegsel in de Ageler es is echter wel succesvol geweest. Grondeigenaar B. Tijink heeft in die omgeving later drie al grote, jonge wulpen waargenomen.

De tureluur

Deze soort lijkt voorgoed als broedvogel uit de Agelose dreven verdwenen. Geen broedpaar heeft zich de laatste jaren hier laten zien.

Afdeling Rossum

Vergelijking resultaten 201 en 2015

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kievit	78	89	60	93	Ca 35	Ca 40	25	42	Ca 30	Ca 35
Grutto	7	7	2	6	1	Ca 3	1	Ca 3	0	0
Scholekster	3	8	2	6	1	3	1	2	0	3
Wulp	5	6	2	4	2	2	?	2	2	1 a 2
Tureluur	6	6	4	4	4	3	?	?	Ca5	6

De kievit

Konden we in het jaar 2014 nog een hoopvolle stijging van 27% melden van het aantal broedparen van de kievit, het jaar daarop, in 2015, daalde het aantal broedparen jammer genoeg alweer met ongeveer 10%. We hoopten dat het daarbij zou blijven, echter dit jaar, in 2016, liep het aantal paren verder terug van 89 naar 78, een daling van ongeveer 12%. Daarmee zitten we weer op het niveau van het jaar 2013 (77 paren). Het is nu echt te hopen dat dit de ondergrens is en een verdere daling achterwege blijft. Er werden dit jaar 60 legsels gelokaliseerd met een geschat aantal eieren van ongeveer 212 stuks. Dit totaal is de som van werkelijk opgezochte en op afstand waargenomen legsels van broedende kieviten.

Van deze 212 eieren zijn er ongeveer 130 uitgekomen, een uitkomstresultaat van circa 61%. Verreweg de meeste legsels (54) bevonden zich op maisvelden, een enkel paartje had gekozen voor grasland of perceel met een andersoortig gewas. Het aantal nestverstoringen bedroeg ongeveer 25, wat neerkomt op circa 41% van het totaal aantal gelokaliseerde legsels, een wel heel hoog verstoringspercentage. Volgens waarnemingen van veldwerkers en attente landbouwers zijn in totaal ongeveer 30 jonge kieviten vliegvlug geworden, hopelijk zal deze aanwas het aantal broedparen in de komende jaren positief beïnvloeden. Het project “Kievit in de herkansing”, dat vijf jaar achtereen in het Rossumse is uitgevoerd, is met ingang van 2016 beëindigd. Van meet af aan was het echter ook de bedoeling om dit niet langer dan vijf jaar te doen. Bij dit project werden, NA het poten van de mais, de kievitlegsels, na herleg, met name gecontroleerd op eierreproductie, bevruchte/onbevruchte eieren, predatiedruk en eindresultaat. Dit alles omdat sprake was van late vervolglegsels, meestal in de maand mei, soms ook nog in juni, en broeden tussen opschietende maisplanten. Uiteraard zijn de verzamelde gegevens en resultaten van dit project ook steeds meegenomen in het “normale” verslag weidevogelresultaten. De conclusies van dit project staan in het jaarverslag 2015.

Aantal broedparen grutto gelijk gebleven in Rossum

De grutto

Na een behoorlijke terugval in 2015 bleef in 2016 het aantal paartjes van de grutto gelijk nl. zeven broedparen. Op één paartje na kozen deze grutto's allemaal voor één gebied nl. het kerngebied “de Benneker” inclusief het aansluitende deel van dit gebied. Er werden slechts twee legsels daadwerkelijk gevonden met in totaal zeven eieren waarvan één legsel met vier eieren is uitgekomen. Het andere legsel is verstoord door onbekende oorzaak. De legsels van de overige broedparen zijn op afstand via monitoring gelokaliseerd, echter de resultaten geven weinig hoop voor de toekomst. Voor zover de bevindingen niet bedriegen zijn dit jaar, evenals in 2015, geen jonge grutto's vliegvlug geworden. Het is erg jammer en triest dat het zo slecht gaat met onze nationale weidevogel.

De scholekster

Het aantal broedparen van de scholekster zit weer op het niveau van 2014 nl. zes. Liet het jaar 2015 nog een stijging zien van zes naar acht broedparen, dit jaar werd deze stijging weer ongedaan gemaakt. Er werden drie legsels gevonden met in totaal negen eieren, waarvan er zes zijn uitgekomen. Twee legsels werden verstoord door onbekende oorzaak. Van de jonge scholeksters zijn er slechts een paar vliegvlug geworden.

De wulp

Het aantal paartjes van een van onze slimste weidevogels, de wulp, liep met één paar terug nl. van zes naar vijf broedparen. Er werden slechts twee legsels gevonden, waarin in totaal acht eieren lagen. Deze 8 eieren kwamen wel allemaal uit, wat uiteindelijk resulteerde in twee vliegvlugge jongen.

Maar dit is altijd nog meer dan niets, het wordt echter wel steeds moeilijker om van kwetsbare soorten als onze openveld- bodembroeders een goed resultaat te behalen voor de instandhouding van de verschillende soorten.

De tureluur

Evenals in 2015 waren ook in 2016 zes paartjes van de tureluur in de Rossumse gebieden. Van deze zes paartjes hadden er 5 hun territorium in de uitgebreide Benneker. In totaal zijn vier legsels gelokaliseerd, óf daadwerkelijk gevonden óf op afstand waargenomen. Deze vier legsels kwamen wel allemaal uit, dit was duidelijk te merken aan de heftig alarmerende oudervogels. Er werden in totaal ongeveer vijf jongen vliegvlug.

Hoop gevestigd op nieuwe aanwas van tureluur

Afdeling Saasveld

Vergelijking resultaten 2016 en 2015

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kievit	35	39	28	30	16	18	17	23	14	15
Grutto	3	3	3	3	0	0	3	3	0	0
Scholekster	2	3	2	3	0	1	2	2	0	2
Wulp	4	3	3	2	0	0	3	3	0	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kievit

De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is in 2016 met 10 % teruggelopen. Met vier broedparen minder dan vorig jaar kwamen we dit jaar uit op 35 broedparen. De meeste kieviten in Saasveld komen voornamelijk nog voor in het Westerikkerbroek en in het Boerenbroek. Deze van oudsher goede en open gebieden blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de weidevogels. In het Boerenbroek is veel werk verzet met het menigmaal verplaatsen van vele mandjes op het maisland, met hierin het legsel van een kievit. Dit heeft maar deels resultaat gehad. Door de hoge predatiedruk van voornamelijk vos en kraai wordt het moeilijk om de kievit voor dit kerkdorp te behouden, ondanks de goede inzet van de vrijwilligers bij het opzoeken en beschermen van nesten en de inzet van enkele lokale jagers om de predatiedruk zo laag mogelijk te houden.

De grutto

Westerikkerbroek, een open gebied dat vijftien jaar geleden nog rijk was aan vele tientallen broedparen grutto's is zo langzamerhand geworden tot een gebied waar het geluid van deze baltsende weidevogels in voorjaar verstomd is geraakt. De vele veldleeuweriken, gele kwikstaarten en grasmussen zijn hier al jaren niet meer als broedpaar waargenomen. Hiervoor in de plaats zijn vele loslopende katten van een lokale boer in de plaats gekomen. Het is geen wonder dat, mede door gebrek aan graspercelen met uitgesteld maaibeheer, de grutto het moeilijk heeft. De snelle achteruitgang van het aantal broedparen grutto's in het kerkdorp Saasveld en het slechte perspectief geeft aan dat er geen toekomst is voor deze soort in dit gebied. Ten opzichte van het jaar 2015 bleef het aantal broedparen grutto's op hetzelfde niveau namelijk drie broedparen. Dit jaar waren er wederom geen succesvolle broedresultaten van deze elegante vogel te melden. Geen enkel gruttokuiken werd vliegvlug.

De scholekster

De luidruchtige scholekster was dit jaar met één broedpaar minder vertegenwoordigd dan in 2015, namelijk twee broedparen. Beide nesten werden gevonden. Helaas waren e eieren uit deze nesten een week later alweer verdwenen als gevolg van predatie. Een vervolglegsel werd niet meer gevonden. Kennelijk hielden deze vogels het toen al voor gezien.

De wulp

Ondanks het toegenomen aantal broedparen wulpen, dit ging van drie in 2015 naar vier broedparen in 2016, kon er geen melding worden gemaakt van een broedsucces. Twee legsels werden er gevonden in het Westerikkerbroek en één nest werd gevonden in het Boerenbroek. Alle gevonden nesten werden gepredeerd en van één nest werd zelfs het broedende vrouwtje doodgebeten door vrij zeker een vos. Ook bij de wulp werden er geen vervolglegsels meer gevonden.

Door predatie een verloren broedseizoen voor de wulp.

De tureluur

Er waren dit jaar in Saasveld geen tureluurs te melden als broedpaar.

Reacties en info:secretariaat@nvwgdegrutto.nl